




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
818/A/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
818/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
818/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
818/A/1

818
A/1

F. III

16/2







GEORGII

BERTINI CAM-

PANI

DE

CONSULTATIONIBVS

Medicorum

ET

METHODICA FEBRIVM

Curatione


COMMENTARIVS.



BASILEÆ

per CONRADVM VVALDKIRCH

MDLXXVI



Dum veteris leges Medicinae expandere scriptis
Bertinus, Coa qua valet, arte parat:
Hunc ab eo sollers de multis antè paratum
Extorsit Sotius Bibliopola librum,
Quem veluti *ἡ πόλις* dimitteret, omnibus indeq;
Auctorem notum, sicut ab vngue, daret.

D. LEBEVS. T.



CLARISSIMO
EQVITI NICOLAO
HARAVCVRIO HO.
DOVILLAE NOBILI REGIS
NAVARRAE à Cu-
biculo

GEORGIVS BERTINVS
Medicus S.



*Um Montebelgardo (quò me è
nouissimis tempestatibus Gal-
licis subduxeram) huc à te
de morbo illo cuius velut im-
portuni tyrānidominatu tan-
diu teneris, consultandi causa aduocatus es-
sem, nullam intermissione officij feci, coad-
iuuante D. GVILELMO ARRAGO-
SIO Medico Cesareo et Regio, probitate &
doctrina commendatissimo, quin omni no-
stra cura studio atq; industria tibi tandem
meliusculè esset. Reliquum succissuum teni-*

A 2

PRÆFATIO.

pus, ad ea quæ de Vniuersa Medicina iam-
 pridem habebam instituta, perpolienda con-
 uerti, ut consecutus iam quod conabar, pa-
 ratum & instructum opus Typographo de-
 mandarim. Qui dum videt id ante initium
 anni venientis integrum excudi non posse,
 extorsit à me ut hunc cōmentarium de con-
 sultationibus Medicorum, atq; de necessaria
 earundē in curandis febribus methodo (in
 quo tractasse videor quæ nec fortasse satis
 sunt nota omnib. & sunt cognitione dignissi-
 ma) de penu illo depromere & velut super-
 fætationem ante partū in apertum proferre
 per me illi liceret, ut & mea sponte & eius
 inuitatu prodesse possem. Cū verò eum no-
 luissem antè à me dimittere, quàm patronū
 illi aliquē splendidum quesuissem, dignus oc-
 curristi mihi in cuius nomine appareret, cū
 propter summa quæ in te sunt pietatis, gene-
 ris virtutisq; ornamenta, tum ob rem ipsam
 de qua agitur, atq; ut quando abs te digres-
 sus ero, presenti declarationi & testimonio
 tibi sit hic libellus meæ in te obseruantia, ple-
 naq; studiij & officij voluntatis, qua et me ti-
 bi semper præstò futurum, spondeo. Vale,
 Basileæ Cal. Aug. CIO IO XIVC.

D E



DE
PARTICVLA-
RI REMEDIORVM
VSVRPATIONE ET ME-
THODO CONSULTATIO-
nis medicæ.

CAPVT I.



Nlegitima & tēpestiua re-
mediorum, & ^{valuationis} symelmi v-
surpatione, tria summa fide *In illis*
ac religione sunt perpēden- *3 conside*
da, nimirum diagnosis, pro- *da & lge*
gnosis & therapeutice. In
diagnosi tria indicationum genera, nem-
pe quæ sunt contra naturam, præter natu-
ram & secūndum naturā singulari cautio-
ne obseruabuntur. Primū in methodica
consultatione indicationes, quæ sunt con-
tra naturam ad amussim sunt examinādæ,
vtpote mōrbus, eiusdem natales & sym-
ptomata. In morbi perspicientia quatuor
summæ & celeberrimæ indicationes sese

I
Diagn

I cori
gta

Mor

17

es

Individuum
res.dolor
dolor
dolor
dolor

melancholia

conspicuè detegunt, species, magnitudo, mos & motus. Specie morbi arguunt natura, eiusdè pars affecta, humoris dominatus, actio læsa, excrementorum conditio & alia signa pathognomonica, quæ partis affectæ & morbi eam obsidentis ideam referunt. Non solum in morbo specie, sed eiusdem individuum spectare oportet, quod ars non solum in illa, sed etiam in hoc versetur. Si enim febris diaria sollicitat, considerata quænam & à qua causa contrahatur. Si hectica ægrum exerceat, providendum an prima, vel secunda, vel tertia species sit. Si continua essentialis, an causus, an lipyria, an hemitriteus, an typhodes, an assodes, an tertiana, an quotidiana: an quartana affligat. Si verò febris symptomaticæ dominatu tenetur æger, æqua animi lance examinandum est, an per congestionem ob partis imbecillitatem, an per affluxum, siue per destillationem, siue per palindromen genitum, siue per anaropem, siue per catarrhopen sic inuehatur, an verò pars labe & corruptela conflictetur. Hæc eadem methodi vestigia in affectibus partium sunt tenenda, ut si dolor capitis urgeat, ad vnguem distinguendum est an cephalæa, à qua causa contrahatur, & quam cerebri partem obsidione cingat. Si melancholia, an hypochondriaca

CONSULTATIONIBVS.

3

Triaca, an corpus vniuersum, an cerebrum tantū occupet. Si apoplexia, an debilis, an fortis: si conuulsio, an tetanos, an emprosthonotos, an episthonotos: si inflāmatio oculi, an taraxis, an ophthalmia, an chemosis: si angina, an vera, an notha: si pleuritis, an vera an falsa: si phthisis, an à destillatione maligna, an ab ulcere pulmonis, an à spinali medulla proficiscatur. Si icterus, an felleus, an criticus, an hepaticus, qui aut ab obstructione, aut inflammatione, aut scyrro ingeneratur. Si hydrops, an ab interturbata, vel priuata vel abolita functione oriatur. Magnitudo verò seu efficacitas morbi ex symptomatum magnitudine, mos ex malitia, & partis affectæ cōditione, modus ex certis excandescentiæ periodis innotescit. Porro in vera morbi historia accurate perpendendum est, an sit acutus, vel longus, recens an inueteratus, an epidemicus, an primarius vel secundarius, an essentialis vel symptomaticus, an bene, vel malè moratus, an vniuersalis, an particularis, an primum inuadens, an alteri succedens, an simplex vel compositus. Sequitur ordine causæ scaturigo, que vel est euidēs, seu externa aut interna: hæc existit vel anecedens, vel continens, proprijsq; signis sese exhibet. Cōtinens verò ab antecedens

apople

conuulsio
inflam

angina

pleuritis

phthisis

icterus

hydrops

ff

magnitudo

mos

malitia

modus

modis

Causa

modis

A 4

te, aut ab aëris vitio, aut ab incauta victus
 ratione, aut partium internarum cōtagio-
 ne genita, vel primam, vel secundam vel
 tertiam corporis regionem obsidet. Pri-
 mum studiosè inuestigandū est an humor
 sit crudus, vel leuiter vel multum corru-
 ptus, qui in pristinam bonitatē redire non
 possit, an facilis vel difficilis, an erodens
 vel lenis, an crassus vel tenuis, an paucus
 vel multus, an syncerus, vel cum sanguine
 mistus, recens vel inueteratus morbi for-
 mam semper inferens, an vagus, vel adhæ-
 rens, vel cū obstructione vel tumore, an
 vitiosus, an corruptus humor cum alicu-
 ius partis corruptela, an cōmitetur pletho-
 ram vel cacochymiam. Adhæc plurimū
 interest cognoscere ubi causa morbifica
 localem habeat generationem, fugacem
 cum simplici & parua intemperie coniun-
 ctam, vel obfirmatam & inueteratam, in
 quibus sedibus stabuletur, quam viam af-
 fectet, & in quas partes proclinas omne
 onus recumbat. Sicuti autem vnumquod-
 que corpus, sic vnaquæque pars suos ma-
 nes & suam noxam patitur. Symptomata
 verò supersunt, quæ in functionibus læsis,
 aut excrementorum vitio, aut simplici cor-
 poris affectu consistunt, suapteque natura
 & propria vniuscuiusque significatione
 conspi-

*Humoris
 sps.*

*Locum in
 quo generatur
 & fertur*

*3
 impleta
 mala*

CONSULTATIONIBVS.

conspicuè se detegunt. Sequuntur ordine indicationes, quæ secundum naturam existunt, utpote peculiaris ægri temperies, naturalis cōstitutio vel acquisititia, vel ab instituto vitæ sic comparata, vel calida, vel frigida, vel humida, vel sicca, vel obesa vel gracilis: pletthorica vel mediocris, rara vel densa, languida vel robusta: quæ visu, tactu & ratione dignoscitur: nec non ætas, sexus & aliæ id genus, sine quarum exacta perspicientia tutò medicinā facere & symmetum adhibere non potest medicus. Præterea non sunt negligendæ indicationes præter naturam, suo loco iam copiosè descriptæ, & sine quarum sedula obseruatione irrita sunt curationis præsidia. Quod ad prognosin secundam vel sinistram attinet: morbi magnitudo vel malignitas, causæ vehementia vel contumacia, symptomatum feritas, partis affectæ conditio, dignitas & necessitas sunt cum viribus, cruditate vel coctione materiæ morbiificæ conferenda, an natura morbi, an morbus naturæ sit potēs. Fida enim præfagia sunt, ex his, quæ necessariò accidunt naturæ & morbi ratione & robore: siquidem vis naturæ ex functionū integritate vel vitio, aut in partibus principib. aut alijs, quæ ab his propagantur, aut alijs, quæ administrationem

II E

q. inu. d. n. m.

III Pler n. h. d. n.

II

progn.

h. c. a.

peculiarem obtinent, consistente dignoscitur: morbi verò natura ex specie, magnitudine, more, motu eiusdem, causa morbifica, ut materia cruda vel cocta innotescit. Quæ autem non necessario contingunt in crisi & solutione morbi sunt animi affectus, ut vigilia, tristitia, quæ iudicium interturbant. Eodem negotio tanquam ex alta specula prouidendum est, ex quatuor morbi, temporum, cruditatis & coctionis crisis, ad diem crisis & excretionis signis, quis & qualis sit morbi exitus. Morbi enim ob qualitatem materiæ morbificæ, crassam vel tenuem quantitatem, paucam vel multam virium effertationem, vel robur, & cutis meatus refferatos vel oclusos aut excretionem, aut diuturna coctione, aut metastasi seu commutatione terminatur: siquidem febres acutæ ex bilioso humore, quantitate mediocri contractæ in corpore vegro, poris apertis & cælo calido per excretionem solvuntur. Ut enim vnumquodque animans proprium vite tempus: sic vnus quisque morbus peculiarem terminum nascitur, nisi hic à medico malè curante, & ægro delinquente interturbetur, aut humor sit turgens, qui orgasmo quodam in partem aliquam principem irruat: humorum enim aliquam partem occupantium certæ

certæ prænotiones: vagantium & furentium, qui in aliquam partem principē impetu decumbere possunt, incertæ omnino existunt. Febres verò acutæ ex humore crasso & multo profectæ in viribus elanguescentibus, cutis densitate & constitutione frigida ob insignem morbi efficacitatem, & contumacem materiæ morbiferæ sequacitatem per coctionem sensim, aut per metastasim, aut per exitialem catastrophem iudicantur. Cum enim ad magnitudinem morbi, aut ad potētem causam aut ad partem principem affectam virium infirmitas accedit res ægri sunt in deteriore & angusto loco. Ad hæc quò plures affectus ægrū immaniter exercent, tanto magis aliquid sinistri portendunt. In hoc negotio nō sunt negligenda peculiaris similitudo & dissimilitudo huic cōtraria, quæ in colore, charactere, mole, motu & functionibus singularum partium versatur. Quinetiam medicus insignis decretorijs & excretionis impetu sagax & prouidus esse debet: quæ quidem peritos delectare, ignaros deterrere solent. Cæterum medicus non modo certum iam nati morbi e-
ad. hio.
in nase
uentum præsentire, sed etiam nascentis & imminētis minus obscura signorum significatione instantem insultum præuidere

debet, non aliter quàm nautæ futuram cæ-
 li tempestatem præcurrentibus signis præ-
 sagiunt. Etenim cacochymia, cachexia,
plethora, capitis grauitas & dolor, obmur-
murantes aurium sonitus, pulsatio tempo-
rum, lachrymæ & caligines oculorum in-
iussæ, palpebræ intumescences, odoratus
hebetior, sudor vndique diffluens, pruri-
tus, lingua crassescens, frequentior expui-
rio, lassitudo spontanea, vigiliarum impro-
ba fatigatio, suffocationum anxietas, sitis
insolens, ex somno labor, animi anxietas,
ventriculi dolor, inflatio, oris amaror, lum-
borum & spinæ grauitas, dolor, excretio-
nes nō naturales & id genus alia signa in-
stantes morbos significant: quibus præcau-
zione, q̄ aut in alteratione, aut pharmacia,
aut phlebotomia cōsistit, statim occurren-
dum, est vt integra sanitas redeat postlimi-
nio, sine qua eximiæ animi dotes & præ-
stantes corporis gestiones splendere ne-
queunt. Quocirca nihil sibi reliqui faciet
ad omnem diligentiam medicus, vt ex na-
tura, causis & effectibus vniuscuiusq; mor-
bi & aliorum signorum significatione su-
prà commemoratorum de opportunis &
legitimis remedijs cogitet, vel deploratos
ægros curandos non suscipiat, & de certo
morbi exitu pronuntiet. Superest thera-
peutice

Signa

causæ
di.

III

crapen
ce.


peutice seu medendi methodus, quæ consistit in decenti qualitate, quantitate, vltimo modo, & vtendi occasione, phlebotomiæ, pharmaciæ & diætæ, sumptis indicationibus à specie, magnitudine, more & motu morbi. Sicuti equidem ex facto ius, sic ex morbi cognitione curatio dependet. Sunt præterea duo profligandorum morborum lumina, nempe methodus & prudentia, de quibus obiter hîc differendum est. Tria verò sunt vniuersalia celeberrima præsidia, quorum duo materias communes excludunt, nempe purgatio, cacochymiam: vacuatio plethoram subtrahunt: diætâ verò virium conseruationem spectat, aut intemperiem alteratione corrigit & emendat. In phlebotomia non modò magnitudinem morbi & virium robur, sed etiam naturam corporis, humoris & cæli summa religione animaduertere debet medicus. Nam qui sunt corpore raro donati, & qui regionem ad meridiem spectantem incolunt, paucam & raram sanguinis missionem ferunt. Quæ enim lege naturæ sunt commoda, ex euentu vt plurimum sunt incommoda. Ad hæc singulari iudicij trutina examinandum est, qua vacuatione vnaquæque plethora demenda est: si quidem plethora pura, tutissimè; impura, non æquè tuto tollitur

2^o lumina
curant.

3^o vniuersalia
p^{re}sidia
curant.

1^o Met^hod^{us}

phlebotomia



litur: impura enim calida, audacter: melati-
 cholica parcè: pituitosa, parcissimè substra-
 hitur. Plethora verò ad vires, quæ nec vasa
 disrumpere, aut calorem obruere potest,
 cùm tamè imbecillas vires premar ne qua
 putredo succedat, vacuatione demitur,
 quæ tantum relinquit, quantum natura fa-
 cilè moderatur. Quineriam in hoc pluri-
 mus sit medicus necesse est, vt studiosè ob-
 seruet, quos & in quibus morbis per aphæ-
 resim, id est vniuersalem, & epaphæresim,
 id est, particularè vacuationem detrahat.
 Pharmacum verò peculiari vniuscuiusq;
 naturæ qualitate & quantitate humoris
 peccantis, & causæ morbificæ, semper ha-
 bita virium ratione, analogum esse debet.
 Vtenim corpus cacochymum robustum
 portione medica leuatur: sic imbecillius si-
 mul cum pharmaco tollitur. Quare in vi-
 rium infirmitate pueris clementiora: natu-
 grandioribus & vegetis validiora & effica-
 ciora sunt exhibenda præsidia. Vtendi ve-
 rò modus pro inclinatione naturæ, ætatis,
 materiæ morbificæ, morbi & meatibus pa-
 tentioribus, commodioribusque: occasio
 verò pro eiusdem morbi moru instituetur.
 Interim præterita causa à medico semper
 est expellenda, præsens submouenda, & fu-
 tura prospicienda. Quæ cùm ita sint vbi
 humor

*hæmorrh.
G'n*

CONSULTATIONIBVS.

humor exuperat vel deficit aut qualitate,
aut quantitate, aut commutatione, aut cō-
nexionē praua, aut putredine, studiosè p-
curandum est quale, an simplex vel com-
positum: quantum, quàm validum, per quē
loca conuenientia, qua ratione, quo ordi-
ne, qua forma, quo tempore, & quàm diu
corpori, aut parti adhibendum sit. Porro
diæta virium rationem respiciens, vel est
vniuersalis, quæ secundum quatuor mor-
bi tempora: vel particularis quæ in perspi-
cuis accessionum inducijs administratur,
iureque & loco instituitur, vt iure in exhau-
sto & virium effœtatione: loco in accessio-
num intermissione. Tria profectò sunt ex
quibus victus ratio sumenda est, 'primum
ex viribus, secundum ex morbi constitu-
tionē, tertium ex accessionum particula-
rium prænotione. Siquidem de cibo vere-
ri oportet in paroxysmis, & in periodica
naturæ perturbatione, vt in accessionibus
colicis, doloribus capitis & aliarum para-
rium. Ea autem cautione & religione nu-
triendus est æger vbi facultas præceperit
& morbus non prohibuerit, ne à pepsæos
aut pepasmi penso distrahatur natura. His
ita stabilitis quo pacto hæc p̄sidia ritè sine
adhibenda strictim & obiter discutiendum
est. Therapeutices, seu curandi methodi a

Diæta

*Modus
adhibendi*

*p. can. 21**curatio**2. 12.**1. 75**In acutis
dieta**Longis**granis**g. 2.**p. 10. 10.**Longis**p. 10. 10.**g. 2.*

lia est præcautio, quæ non morbū, sed cau-
sam morbi spectat: alia est curatio, quæ af-
fectum vrgentē oppugnat. Præsens autem
seu vrgens vel est essentialis aut sympto-
maticus: essentialis verò vel est simplex, vt
acutus, peracutus aut extremè peracutus,
primarius, vel secundarius, vel compositus.
Symptomaticus autem aut ab inflamma-
tione, aut à partis corruptela, aut à putri-
dis humoribus circa eam congestis profi-
ciscitur. In morbis acutis victus tenuis: in
peracutis tenuior: in extremè peracutis te-
nuissimus: in longis, plenus instituendus
est. Quantitas huius ex qualitate, copia &
numero ducta, pro virium robore, & mor-
bi constitutione præscribetur. Vtendi mo-
dus ex qualitate, copia, numero, cibo parū
vel multū nutriende, longiorib. vel bre-
uioribus interuallis sumpto decernetur.
Qua parte autem natura conflictatur, hac
illi sic opitulandum est, vt viribus alimen-
torum pepsi & exhausto, opportunè suc-
curramus, & morbo ferociēti occurramus.
In morbis peracutis & extremè peracutis,
qui vehementer, celeriter & continenter
mouentur, & quando natura statim erit in
procinctu protinus ad phlebotomiam cō-
fugiendum est, quæ portionem causæ mor-
bificæ exhauriat. Pharmacia verò tunc est
suspe-

ſuſpecta, quæ febrem auget, & ad ex-
deſcentiam proritat, viriumque robur in-
fringit. Morbi autem qui lento gradu pro-
cedunt in hiſq; lugent ſub pondere vires,
phlebotomiæ & pharmaciæ præſidijs pau-
latim per epicraſim materiam peccantem
demoliri opere præcium eſt. Interim pluri-
mum blandis medicamentis ſeu minora-
tius humores in prima corporis regione
ſtabulantes ſunt excludendi, ſenſimq; ex-
turbandi. Et enim in morbis longis à leui-
oribus ſemper eſt auſpicandum, certamq;
qualitatem, quantitatem, uſus rationem &
occaſionem præparationis ſumptis indi-
cationibus à qualitate, copiâ, ſitu & motu
humoris inſtituere ſemper decet; quod
in ſingulis morbis, ſiue magnis ſiue paruis
æqua lãce examinandum eſt. Vt enim cer-
tus temperamentorum in corporibus, ſic
in medicamentis ordo perpendendus eſt,
vt morbis paruis blandiora: magnis vali-
diora præſidia adhibeantur, vt ſunt pyro-
techmia extracta, quæ Gale. in lib. de the-
riaca ad Piſonem approbat & parat. In a-
lijs verò; in quibus eſt brevis hiſtoria, ſta-
timque orgaſmus aut eclampſis adeſt, mo-
ram nullam poſtulat morbus, protinusq;
adhibenda ſunt ſine cunctatione remedia.
Porro in varia multorum affectuum ſyn-

drome miscenda sunt quæ humorum putridorum varietatem & singulas partes affectas spectant. sicque topica remedia methodica curatione sunt adhibenda. Eodem negotio procurandum est ne per metastasim morbus in alium affectum mutetur: ut diaria plethorico corpore existente in synochu: cacochoymo, in febrem putridam: sicco, in hecticam promptè transeat. Huc accedit quod in morbis symptomaticis, & in legitima febrium symptomaticarum curatione duo veniunt accuratè spectanda, fluxio & inflammatio: fluxionis seu palindromes præsentissimum præsidium est reuulsio: fluxione sedata inflammationis curatione suo loco tradita tentanda est. Cum verò post vehemenciam vel diuturnitatem morbi intemperies, vel imbecillitas & humorum reliquæ ut plurimum supersunt: intemperies seu diathesis morbosa primo loco emendanda est, ne nouam cacochoymiam & luxuriantem humorum prouentum progignat: siquidem ventriculus intemperatus & imbecillus malâ chylosim: sicuti hepar intemperie & imbecillitate affectum, viciatam hæmatosin celebrat, inde ex vtriusque partis vitio cacopragia emergit, ex qua copia humorum recidiui affectus soboles succrescit, Vires autem recreabuntur.

abuntur alimentis euechymis, cardiacis & hypnoticis, sumptis indicationibus à natura humoris & celi: nam temperamento, humori & celo calido, liquida: humido, sicca conueniunt. Humorū reliquie blandis pharmacis excluduntur ne superstes cacoehymia affectum priore deteriore mignat: lyncerum autem nisi vas, quodcumque infundis acēsit. Porro vt hęc omnia votis respondeant & in vsum reuocentur, desideratur prudentia, ad quam recta ratio, cautio & prouidentia referuntur. Recta ratio, fit quando vniuersa theoremata particularibus & singularibus ad amulsim accommodantur. Non enim authore Galeno satis est communem naturam agnouisse: sed etiam operæ precium est priuatam & peculiarem exactè cognouisse, quę ex rara vel densa conflatur: quippe hoc ex frigore & materia crassa, illud ex ea tenuiore & vi caloris magis defecata cōponitur. Prouidentia verò est, quę certis signis futuras res auguratur atque præuidet, sicquę succurrit medicus vt in angina & in muliere circiter vigorem paritura, magna fore symptomata & virium insignem effœtationem prospicit, vberiore & liberaliorem ante hoc tempus victus rationem decernit, vt futurę virium iacturę consulat. Nam æger

II.
p. 20 de
2a
2a 20

prouide
2a

in anginae vigore nihil prorsus deglutire potest: mulier verò in partu iam viribus fractis & prostratis statim succumberet. Cautio verò fit, quando medicus in hoc totus est vt singulari iudicij acie morbos distinguat, incognitos pro cognitis non habeat, & eosdem curatu difficiles pro facilibus amplectatur, & praua pro probis in egrorum perniciem perperam suscipiat, pretiaque ob ignorantiam ferat. Quare haftenus dictum est de particulari remediorum usurpatione, & methodo consultationis medicae, quæ in decenti dietæ minoratiuorum seu blandorum medicamentorum vacationis, præparationis & purgationis, qualitate, quantitate, vsus ratione & occasione sumptis à specie, magnitudine, more & motu singulorum morborum indicationibus postea elucescet.

De curatione diariarum

Cap. II.

CVM medendi methodus sit tuta & re-
pestiua remediorum applicatio, cer-
tus theorematum, verorum, vtilium, & in-
ter se conuenientium ordo, vniuersalis &
ordinata, rationiq; consentanea curando-
rum morborum via, quæ omnium singula-
rum cõmunis euadit, hæc eadẽ in singula-
rum febriũ curatione nunc excutienda ve-
nit

CONSULTATIONIBVS.

nit exordio sumpto à diaria, quæ in aerea
& spirituoſa ſubſtantia exandefcente reſi-
det. Communis autem materia & indica-
tio diariarū eſt aerea ſubſtantia præter na-
turam incaleſcens, & à cauſa procatharti-
ca recenti originem ducens. Prima igitur
indictio à morbo, & à ſimplici contra na-
turam calore, qui refrigerantibus & hu-
meſtantibus præſidijs ſumptis, & admo-
ris legitimè & cōmodè proſtigatur. Quin-
etiam ſumitur indictio à cauſa, pro cuius
varietate particulares & diuerſæ curatio-
nis indicationes ſeſe offerūt. Nam quam-
uis omnes febres diariæ ex ſpirituoſa ſub-
ſtantia accenſa cauſas trahant, vno die de-
ſinant, & refrigerantibus, humeſtantibus-
que ſubſidijs indigeant; tamen pro cauſa-
rum varietate particulares & diſſimiles
emergunt curationes. Vnde cū Galeni *Defenſio Ga-
leni.*
aduerſarij non aſſequerentur, primam in-
dicationem à morbo, nec nō præcipuam,
vtilemque à cauſa ſumendam eſſe, in va-
rias errorum ſalebras inciderunt. Indica-
tio enim prima & vniuerſalis tanquam ſu-
ſcitamentum à morbo ſui ablationem per
contrarium indicat. Siquidem indictio
prima, quæ à morbo depromitur, ſui abla-
tionem ſine aliqua rationis & cogitatio-
nis ope, tanquam aliquid nocēs compræ-

hendit Indicatio verò à causa sumpta aliquid magis speciatim & vtile, & quid molliendum sit, certò indicat. Cùm enim sit comprehensio nocentis & iuuantis, sensui communi & intellectui hæc sese prorsus offerunt, cogitationisquæ & rationis obsequio minimè opus est. Nam auctore Gale. bruta etiam animantia primo & peculiari intuitu consequuntur vtilia, & noxia fugant. Nemo nescit, quòd si spina aliqua digito infixæ sit, sine cogitatione, ratione, & arte rusticus stupidus sola indicatione à comprehensione nocentis deriuata, hanc eandem spinam offendentem sine vllo rationis & consultationis discursu euellit. Itaque his ita primum stabilitis omnis diaria quatuor remedium generibus expugnabitur.

Victus ratione, nempe alimentis natura humidis & concoctu facilibus, quæ pro varijs causis, viribus, & conditione ægrotantis tutò decernuntur. Qualitas enim victus, vt supra demonstratum est, à natura morbi, viribus & natura ægrotantis instituitur: sicuti eiusdem quantitas pro magnitudine affectus, viribus, & ætate ægri, & pro accessionis inducijs exhibetur. Primum qui animi affectibus, labore, vigilia, mœrore, timore, & frigore

re fe-

re febricitant, cibis boni succi, & vino oligophoro diluto sunt recreandi. Qui verò febre corripiuntur ex dolore, furore, & inguinum inflammatione, à vino vt placuit Græcis & Arabibus sunt arcendi. In quorū colonia censendi sunt, qui repletionē laborant. Qui porrò febricitant ex ira, & ardore, refrigeratibus: qui frigore in febrem diariam inciderunt, moderatè calfacientibus sunt alendi: sicuti qui ex vigilia febricitant, somnum conciliantibus recreandi veniunt. Quinetiam quantitas præscribetur pro ægri natura, & varijs febris causis. Plethorici autem inguinum inflammatione & ebrietate affecti, tenuiori victus ratione sunt nutriendi. Græci & Arabes in animi affectibus, vt in cura, timore, mæstitia, & lætitia vinum non denegant, sed ab eius vsu arcent, qui ex ira & dolore febricitant. Occasio verò cibi porrigendi præcipuè sumitur ab accessionis inducijs: nam sumitur indicatio ab accessione & motu morbi non tanquam decernens, sed tanquam prohibens, quæ tunc temporis nihil teste Hippocrate, dandum esse inhihet. Quocirca exhibendus est cibus in declinatione febris. Sed cū necessitas vrget ad curationem extraordinariā statim confugiendum

est præcipuè in his, qui febricitant ex fame, labore, & tristitia, quibus in principio febris cibus non est denegandus.

II. Causam abigētibus, quæ Galeno lib. 10. Method. cap. 2. duplex est, aut cum causa effectrix abiit, ut exustio à sole, quæ mora sub umbra, alimentis alterantibus, nempe refrigerantibus, & humectantibus obliteratur: altera non effectrix causa adest, non ita propria & exquisita censetur, ut febris ex inguinum inflammatione contracta, quæ teste Aetio sanguinis missionem postulat. Porro febres in quibus causa adhuc committatur, contrarijs præsidijs propulsandæ veniunt, ut meatuum densitas, aperientibus & discutientibus, febris à labore profecta, quiete, à vigilia nata somno: sicuti mœror, animi tranquillitate, lætitia, mœroris auxilio abigitur. Præterea Græci & Arabes censent diariam plurium dierum, discutientibus, & sanguinis missione curandam esse.

III. Prohibētibus ne diaria in aliam febrem mutetur cæcos cutis meatus dilatando, vapores resoluendo, & calorem alterando balneis & frictionibus. Febres autem omnes diariæ teste Galeno lib. 1. ad Glauconem balneis sunt profligandæ. Qui enim ex cutis densitate, aut inguinis inflammatione

ione febricitât, aëre balnei supramodum
iuuantur. Reliquos omnes quàm citissimè
ab aëris occursione semouere oportet. O-
leo verò multo tepido & manibus mollib.
perfricare quàm plurimum, sed eos præ-
sertim, qui ex labore in febrem incidunt,
secundo loco, qui meatus habent obstru-
ctos, ac tertio qui inguinum inflammatio-
nem patiuntur, quos nimirum sæpius laua-
re expedit: tamen vt idem testatur Galen.
lib. 8. Methodi vlcus, quod bubonem inue-
xit, curandum est antequàm sit tutus bal-
nei ingressus. Præterea diaria plurium die-
rum non solû sanguinis missione adimen-
da est, sed cibi & medicamenta ex his, quæ
detergunt, exhibebuntur. Cùm enim hu-
morum exuperantia sit causa effectrix, vt
diutius protrahatur febris, primum vacu-
atione tanquam præsentissimo remedio
succurrendum est. Deinde humorum cras-
sities extenuantibus, lentos detergētibus,
& cutis densitas rarefacientibus radicitus
extirpantur. Mesue febricitantes tristitia,
oleis frigidis & humidis astrictione caren-
tibus, nempe oleo violaceo & nenupha-
re curandos esse censet. Ad hæc iubet fe-
bricitantes labore & calore balneis aqua-
rum dulcium oleo simul permisto lauan-
dos esse. Qui verò febricitant ex quiete,

balneis discutientibus ad sanitatem fun-
reuocandi, si eidem fides adhibenda vide-
tur. Dexter porrò balneorum vsus ea cau-
tione est instituendus, vt sine horrore in
declinatione febris impuris humorib. in
prima corporis regione minimè scatentib.
catharro neutiquam urgente, & parte prin-
cipe non affecta administretur.

v. Symptomata emendantibus, vtpotè si-
rim demulcentibus, quæ syrupo violaceo,
aut iulepo Alexandrino cum aqua cocta
mixto imminuetur. Quinetiam portula-
ca in ore contenta, & conserua rosarum
sumpta si rim fallere creduntur. Dolori
capitis betonica fronti admota mihi sic
opitulari censetur. Somnus verò concili-
liandus erit conserua rosarum fronti ad-
mota, vel vnguento populeo carpis ma-
nuum imposito, vel fotu lactucae, mal-
uæ, & violariæ, quò pedes & manus ho-
ra somni lauentur. Quamobrem cum dia-
ria sit exigui temporis, & curatu facilis,
raroque ad huius curationem vocetur me-
dicus, plura non dicam, cum etiam Gale-
nus de hac fusissimè scripsit.

De curatione synochi non putris.

CAPVT III.

SYNOCUS non putris ab exuperanti san-
guinis inflammati copia contracta ma-
nife

nifestum sui specimen edit in corpulentis plethoricis succulentis, & rubicundis. Præcipua igitur indicatio à plethora & sanguinis inflammati vbertate sumenda venit, & quinque remediorum generibus extruditur.

Victus ratione refrigerante, humectante & tenui, ut prunis elixis, hordeatis, panatellis ex pane loto confectis, & ptisana. In legitima autem victus ratione minimè peccandum est, quæ pro virium robore & ægri tolerantia decernitur. Siquidem qualitas à natura morbi, viribus, & conditione ægrotantis, quantitas ex magnitudine affectus, viribus & ætate, ægri exhibetur. Quo equidem morbus acutissimus, eò tenuior victus est præscribendus. Modus usus alimentorum in hoc versabitur, ut potus actu frigidus, præcipuè instituatur. Superest occasio, quæ cibum eo tempore ægris decernendum esse indicat, quo hi vesci consueverunt. Præterea placida animi tranquillitas, corporis quies, somnus mediocris, & fuga vini imperentur. Ptisana seu aqua hordei, testimonio Arabum, est flatulenta, quæ addito & incocto coriandro emendabitur.

Minuentibus humorem in prima corporis regione congestum clystere potius, quàm pharmaco, ne sanguis ob portionem


sumptam magis excandescat. Quamuis autem fæces & humores excrementitij in intestinis cumulati febrem synochum nō pariant, & in continente causa non censentur, hanc eandem tamen non parum augent. Idcirco in hoc laborandum est, ut semper bellè respondeat aluus, humoresque superuacanei ænemate refrigerante, emolliente, & purgante excernantur, nempe libra vna decoctionis maluæ, althææ, lactuæ in qua dissoluantur cassiæ recens extractæ, sacchari rubri singulorum vncia vna, & olei violacei vnciæ tres.

- ¶ II. Vacuatione, nempe sanguinis missione, quæ mutuo Græcorum & Arabum consensu vsque ad lypothimiam administranda est, modò vires & aliæ indicationes non reclamant, siquæ aliqua indicatio hanc dissuaderet, tunc minori copia per vices repetita opus esset. Interim sanguis statim mittendus est, ne pleuritis aut peripneumonia ad ægri perniciem protinus consequatur, synochusque nōn putris repente faciescat in putrem. Cùm igitur sanguis copia exuperet, citò euacuandus venit, quòd natura morbi & vires ægrotantis id persuadeant. Quantitas verò à primarijs indicationibus nimirum morbo & viribus ægri, & secundarijs à temperamento & corporis ha-

his habitu, nec non coindicationibus ab
 etate, cæli statu, victus ratione, vacuatio-
 ne præcedere immodica, vel suppressa, &
 ex futura actione læsa depromptis, regio-
 neque calidior vel frigidior, vel meridiæ
 vel septentrionem spectante.

Purgantibus humorem biliosum drach-
 ma vna & dimidia, aut drachmis duabus, IV.
 theibarbari electi infusis & maceratis, aut
 in succo rosarum, aut in stillatitio cichorij
 liquore, aut in decocto cichorij, endiuæ,
 oxalidis, thamarindorum pinguium, pru-
 norum, quatuor seminū frigidorum maio-
 rum, & florum cardiacorū, addendo syru-
 pi ex infusione rosarū sescūciam, trochisco
 rum è caphura parum. Accidit enim vt te-
 nuior sanguinis portio in bilem promptè
 mutetur, cuius qualitas pro natura morbi,
 quantitas pro magnitudine eiusdem, con-
 ditioneq; & natura corporis, humoris, &
 cæli semper præscribitur. Galeni aduersa-
 rij hîc obiter reprehendēdi sunt, qui hunc
 accusant, quòd malè scripserit medicamē-
 ta tota substantia non forma humores pur-
 gare, cū per totam substantiam formam
 intellexerit.

Alterantibus & poros aperientibus. Cū V.
 enim signa concōctionis apparent, aquæ
 frigida potus suffragijs medicorum Græc.



corum & Arabum est propinandus, modo æger non sit infirmo ventriculo. Alio-
qui satius esset miscere cum aqua cocta
syrupos vel è limonibus, vel acetosi sim-
plicis, vel violaceum, vel conditum ex
conseruis rosarum, oxalidis, nymphaeæ,
& puluere diamargariti frigidi compara-
tum, & ægro exhibere. Prætereà cautio-
nes in propinanda aqua sunt perpenden-
dæ ex natura ægri frigida, vel gracili, ex
parte affecta, vt inflammatione, & abcessu,
& materia adhuc cruda. Quarto die teste
Galeno ad balneum aquarum dulcium du-
cendus est æger, frictioque instituenda.

Frict.

Sympt.

Quinetiam ad obtundendum calorem e-
pithemata regioni hepatis & cordis in lib.
de compositione Medicamentorum de-
scripta admonebuntur. Nisi equidem in-
temperies relicta elueretur, aut recidiuus,
aut nouus affectus priore deteriore excita-
retur. Porro si quæ symptomata sese offe-
runt, peculiaribus remedijs minimo ne-
gotio corrigentur. Sempervero in hoc la-
borandum est, vt necessarius singularum
partium calor innatus & influens hu-
ius factor & reparator, quoad
feri possit, integrè con-
seruentur.

De

De curatione synochi putris CAP. IV.

Synochus putris, aut ab exuperanti sanguinis fœnore, aut à permistione, vel bils, vel pituitæ corruptæ genita septe prædijs radicatus extirpatur.

Victus ratione refrigerante & humectante, tenui & non multum nutriente, uæ in legitima & tempestiua qualitate, quantitate, vsus modo, & occasione sumendorum, admouendorum, educendorum, & faciendorum artificiosè versabitur, vt aëre, natura, vel industria refrigerante, cibis refrigerantib. veluti prunis elixis, hordeatis, iusculis borraginis, buglossi, lactucæ, portulacæ, endiuie, & oxalidis, panatellis ex pane loto confectis, & prisana, quiete corporis, iucunda animi tràquillitate, & alijs eiusmodi, quæ desumètur à natura morbi, viribus & cõditione ægrotantis. Quantitas p magnitudine affectus, virib. & ætate ægri variè exhibenda venit. Quod ad modum plus spectat, alimenta liquida concoctu facilia, & actu frigida sunt porrigenda. Galenus verè atque sapienter scripsit à carnis us absis abstinendum esse.

Humorem minuentibus, vt clystere emolliente, euacuante, & refrigerante supra commemorato, vel vncia vna cassiæ

vis.

me l. d.
It.
clyster

recenter extracta, & bolo exhibita, præcipuè si prima corporis regio magna humoris impuritate sordescat. Hoc semper ratum esse debet, ut humor vitiatum in prima corporis regione contentum in principio repurgetur, ne eiusdem humoris putridi colluies ad maiorem perniciem in secundam transferatur, contumaciorque obstructio inuehatur, affectusque ferocior euadat. Ex hisque colligendum est, quod sanguinis missio purgationem semper antecedere non debet.

iii. *Vener*
scilicet Vacuatione, nempe sanguinis missione, cuius quantitas pro viribus ægri, temperamento, corporis habitu, & ætate, natura cœli, & victus ratione, vacuationeque suppressa vel immodica præcedente decernitur. Cum autem sanguinis exuperantia sit præcipua causa prohibita transpirationis & putredinis præsentissimum remedium in euacuatione versatur, quæ in principio semper administranda venit, ne in anceps suffocationis periculum præcipitetur æger. Putredinis equidem labes quam citissime fieri potest, submouenda est, ne sanguinis moles magis vitium faciat, feritasque affectus magis excandescat. Si vires non ferant sanguinis missionem, quæ ad hypochimam celebratur, tolerabilior repetitio

petitio censetur. Reformidanda est nunc antiquorum ad viginti quatuor vascula vacuatio, quòd singula vasa vncias quatuor contineant.

Apparátibus humorem nempe crassum
extenuando, & lentum detergendo. Ob-
structio enim causas trahit ab humoribus
multis, aut crassis, ad cuius expeditiorem
victoriam multi primo loco sunt euacuandi,
è vestigio crassi extenuandi, & lenti si-
mul detergendi veniunt. Nam cum in sy-
nocho, aliquando bilis vt plurimùm, aliquã-
do rarò pituita, aliquãdo rarissimè humor
melancholicus simul cū copioso sanguine
vitium facit, fit synochus, vnaq; sanguis, id
est maior portio omnium humorū ad pu-
tredinē procliuior euadit, vel alius humor
cum exuperanti sanguine putrescit. Itaq;
siue sanguis putredinis labē induat, tenui-
orq; eius portio in bilē promptè transeat,
siue pituita aut bilis pariter & simul corrū-
patur, apparādus erit humor, vt bilis vitel-
lina alicuius crassitie particeps, aut alte-
rius humoris comes, incidentibus absque
manifesto calore, nimirum syrupis ex ace-
tositate citri, è cichorio cum aquis stilla-
titijs, oxalidis, endiuia, & buglossi. Quin-
etiam si pituita simul permiscetur, oximel
simplex, & syrupus capilli veneris non in-

C

commodè cōmisceri poterunt: sicuti si humormelancholicus (quod rarissimum est) putredinem induit, syrupi è buglosso, è fumaria & è lupulis permiscebuntur. Syruporum dosis vt plurimum est sescunciæ, & vnciarum duarum, & decoctionis vel aquarum stillatitiarum vncias tres non superat. Arabes ad corporis præparationem, decoctum seminis althææ præscribunt.

7. 285 v. Purgantibus humorem præparatum in principio & incremēto, cuius quātitas ex magnitudine morbi, viribus ægrotātis, natura morbi & humoris, & conditione ægræ æstimabitur. Porrò si humor biliosus exuperat, fiet infusum ex 3. 2. reibarbari electi gran. 5. spicę nardi, myrobalanorū flauarū confricatarū, oleo amygd. dulcium 3. 3. vel semuncia in aqua cichorij, vel in decocto thamarindorum pinguium, prunorum damascenorū 4. seminum frigidorū maiorū, & trium florū comuniū expressioni colatæ, addetur syrupi ex infusione rosarū 3. 1. & trochiscorū è caphura 3. dimidijs. Mesues opinatur humorē tenuē coctione incrassandum esse, ne excernēdo erodat. Sed si natura & per se tenuis euadit, humor statim repurgandus videtur, ne diuturniore mora quam excretionē maius incommodum adferat.

Alte.

CONSULTATIONIBVS. 31

Alterātib; & discutientib; intemperie vi
 & imbecillitatē à feritate morbi relictā, re-
 liquiasq; humorū, ne recidiuus affectus su-
 scitetur. Calor. n. febrilis frigide aque potu
 aut aqua hordei, coriā dri, & glycyrrhizę a-
 ctu frigida, aut syrupo ex acetositate citri
 simul perfuso obtūditur, exhiberiq; debet
 cū signa coctionis se detegūt, eaq; lege, mo-
 dō æger sit firmo ventriculo, nullaq; labe-
 n viscerib; internis sublit. Cōsultius aut es-
 set tūc ad tabellas diamarg. frigidi, ptisanę
 cū rosarū cōserua permistæ, potū, & epithe-
 nata accōmodata confugere. Quinetiā cū
 prohibita trāspiratio à meatib; cutis densa
 is genita integrā febris solutionē remore
 ur frictionib; poros aperientib; & rarefaci-
 entib; veluti decocto, vel oleo camemeli a-
 limetur & reserabitur. Interim habēda est
 temperatio humoris morbū cōmittentis.
 Nā febris synochus est ex colonia acutarū
 o ardentiu, sanguisq; qui in bilē facessit,
 ebrē mitiorē quā ea, quæ ex bile iā diu pu-
 rida ingenerat. Vbi. n. bilis vitellina iā diu
 nalescēs diutius in corpore immoratur,
 ebrē vehemētiore parit: sed sanguis putref-
 ens tenui portione fit biliosus, nō ita cal-
 et torridus, & crassitie melanch. vt ab a-
 bile profectus febrē mitiorē inuehere
 olet. Prætereā hic obiter notandū est, qd

si sanguis in paruis venis putrescit, tertiae febris naturā redolebit, veluti si in partem aliquam irruat, protinus inflammationem committit.

VII.

*Syrupus
Limonis.*

Symptomata emendantibus, ut sitim & putredinem arcentibus syrupis ex acetositate citri, è limonibus cum aqua cocta sumptis, & conditis ex cōseruis rosarum, nymphaeæ, & puluere diamargariti frigidi comparatis. Somnus conciliandus erit somniferis sumptis & admotis: fit autem somnus cum calor à superficie ad cētrum reuocatur, tuncque benigni vapores in cerebri arcem irrepunt. Vnde tunc somnifera instituuntur, quòd his calor intercipiatur, ne in cerebrum conuolet.

De curatione febris hecticæ. Cap. v.

EXimij & periti medici non solùm tutò & iucundè omnem affectum profligare debent, sed etiam in hoc plurimi sint necesse est, ut citò remedia decernant. Quod sedula opera in febris hecticæ curatione, ob præcipitem morbi feritatem, labascentem virium infirmitatem, & exhaustā, permutatamque calidi fixi & influentis substantiam tentandum est, antequam in febrem marasmodem traducatur. Natura enim solo instinctu functiones explet, &
mor-

morbum tanquam sæuissimū hostem depellit: sed liquecentem effluuij iacturam sine oportuna medici ope reparare nequit. Hæctica igitur citra marasimum, quæ aut ardentibus febribus, aut inflammationibus & vlceribus partiū principum, aut diariæ succedit, quinque remediorum generibus sanescit.

Victus ratione in sumēdis, admouendis, i. educendis, & faciendis, frigidam & humidam vim sortita. Instituentus porro est victus refrigerās, & humectans, qui alteratū & inanitum corpus corrigit, & replet, prohibetq; quæ substantiā alterare & euacuare possunt. Idcirco æger aëre libero & clementi, refrigerante & humectante fruatur, si febrem spectas, & siccante, si vlcus pulmones obsidet. Cum autem vlcus pulmones immaniter exercet, calorq; præternaturā & febrilis comitatur, aër frigidus: sed ad glutinādum vlcus necessariò siccus desideratur. Vescetur cibus concoctu facilibus iusculis euchymis, & multum succulentis, & gelatinis, consumptis: instaurantibus, ordeatis, panatellis, iusculis cancrorū fluuiatiliū, & alijs eiusmodi, quæ corporis maciati iacturam refarciāt, prompteq; assimilantur. Inter omnia alimenta principatum tenet lac, quod horis quatuor antè pran-

pradium cū saccharo ros. sumendū est, ne vitium faciat, & tandem corrumpatur. Lac porro primum humanū & caprillū magis nutrit, asininū deterget, & bubulū calfacit, obstructionsq; protinus inuehit. Alterabuntur verò iuscula, portulaca, lactuca borragine, buglossō, hordeo excorticato, & seminib. lactucae, portulacae, & melonum. Quinetiam parabuntur hordeata ex amygdalis recentib. quippe amygdalae venteres sunt oleaginosae, calfaciunt, ventriculum subuertunt, & in bilē minimo negotio mutantur. Interim motus, vigiliarū importunitas, & animi affectus vitabuntur, quorum loco corporis quies, animi tranquillitas, & somnus moderatus substituētur. Cū autem vires elanguescunt, sapius & parca manu cibus ingerendus erit. Potus erit ptisana ex hordeo, passulis, iuiubis, sebesten, coriandro, & glycyrrhiza comparata, aut aqua cinamomi, aut vinum oligophorum aqua dilutum, in qua pimpinella incocta aut infusa fuerit. Itaque ad tempestiuam & idoneam victus rationem decernendam non solum vires, sed partes affectae, nempe cor & partium solidarum substantia exacte perpendentur, vt effluuij instauratio & reparatio fiat, quae quidem est mutatio è mino-

minori quantitate in maiorem. Etenim cum cor calida & sicca intemperie in febre hæctica conflictatur, spiritumque vitalem non nisi paucum, parcum & accensum conficiat: accidit ut hic cum sanguine calidiore efferuescens proferat calidum influens, quod in officina cordis excandescit & imminuitur, cumque ad cæterarum partium alimentum & vitam deuehitur, ob exuperantem singularum partium calorem et imbecillitatem, nequaquam probè apponi, agglutinari & assimilari potest. Cum enim calidum innatum sit substantia semper mobilis, propriaque & peculiari natura ad superficiem deferatur, & alterno motu à superficie ad centrum modice calfactum et auctum moueatur tuncque hoc bene temperatum caloris et frigiditatis particeps suapte natura ad partes externas functionum obeundarum gratia inuolat, et obtemperiem minimè exhalat, alternoque motu ad resarciendam penuriam et alimentorum concoctionem intro reuocatur. Vnde mirum non est, si in febre hæctica nimio opere accensus permuratus, et imminutus calor ille fluens, in partibus internis absumatur, et in externis partim dissipetur, immutetur et

& eadem opera non elaboretur. Siquidem intemperatum & imminutum, neque intro neq; foras naturaliter impelli potest, sed protinus permutatur & exhauritur. Hinc admirabilis temperaturæ singularū partiū harmonia dissoluitur: præclara concoctionis æconomia interturbatur, fibræ ad appositionem, agglutinationem & assimilationem necessariæ in vëtriculo nequitquam procreantur, calor influens excandescit, confertim euolat, singularumque partium, earundem necessarium nutrimentum desideratur. Quocirca siue calidum primigenium, siue influens alterantibus, refrigerantibus & humectantibus alimentis indiget, vt quàm citissimè fieri possit periculosa vtriusque iactura reparetur. Porro in omni affectu sic authore Galeno alendus est æger, vbi facultas præceperit, & morbus non prohibuerit.

- II. Causam abigentib. qua sublata morbus euestigio eximitur. In methodica enim & legitima curatione semper procurandum est, vt tota morbi radix, quæ adhuc altius inhærescit, penitus euellatur, ordineque morbus adimatur. Hinc accidit, vt morbi labes non repullulet, nullaq; symptomatū vestigia postea remaneant. Si enim, exēpli gratia, insignis animi affectus vrgētius sollicitat

licitat, omnibus rationis & orationis lenocinijs est demulcendus & cōpescendus ne vniuersa sanguinis moles nimiooperè effervescat, calidumq; innatum permutetur & absumatur. Si ventriculi infirmitas sit præcipuum huius mali seminarium, fibręque ad apponendum & agglutinandum necessarię in chylo ritè non conficiantur, hæc infirmitas primùm legitima victus ratione vindicabitur, humores exuperantes apparabuntur, præparati repurgabuntur, intemperies emendabitur, & simul ventriculus roborabitur. Si vlcus pulmonis à catarrho contrahitur, accōmodatis primùm subsidijs, utpote caput siccantibus, reuelentibus, cucurbitulis scapulis impositis, suffribus & phænigmo principio spinalis medulæ admoto sistendus venit. Interim si humor exuperat, legitima præparatio procuranda: deinde tempestiua purgatio ordine tentanda est. Cùm vena aliqua pulmonis rupta est, quicquid in pulmonibus continetur primo loco præparandum, subinde expectorandum erit. Postea vlcus peculiarib. præsijs & bechicis tergebatur, & eo deterfo carne implebitur, tandemq; ad cicatricem perducetur: nempe conseruis & syrupis tussilaginis, scabiosæ, saccharo rosato, tabellis è terra Lemnia, pul-

mone vulpis præparati, & suffribus tussilaginis concinnatis, & puluere tussilaginis siccae à Dioscoride celebratis. Non quod pars solida sed talus eius vice regignatur: desideratur enim materia, facultasque formatrix, quæ veluti in fœtus formatione perfecta deest. Præterea si vlcus alicuius partis, & ventriculi hepatis, mesenterij, vteri aut alui profluuij huius morbi soboles sit, illa prius extirpanda videtur.

III Alterantibus & calorẽ plus æquo effervescentem obtundentib. antequam ægri in hecticam marasmodem nõ impunè decendant. Est autem alteratio qualitatis exuperantis mutatio, quæ aut intus sumptis, aut admotis remedijs ritè cõparatur, sumpta vel sunt alimẽta quorũ suprà abundè meminimus: vel medicamẽta, veluti syrupi è nymphaea, borragine, scabiosa, tussilagine, violaceus, tabellæ seu electaria trium santalorum, diatragacantum frigidum, saccharũ rosatũ, conserua buglossi, & lac asininum: alia sunt admouenda, vt epithemata cordi & hepati imponẽda, oleũ amygd. dulciũ, violaceũ, mucilagines psilij, & cydoniorũ, & balneũ, in quod primũ temperarum: deinde tepidũ, & eodẽ tẽporis vestigio in frigidũ ingreditur æger, modò ab vlcere pulmonis, aut ab aliqua parte: prince.

cipe affecta morbus non emergat. Nam testimonio Galeni balnea partibus principibus imbecillis, aut læsis suspecta esse debent. In demolliendo porrò affectu necesse est ut alteratia affectui delendo paria & æqualia sint, mutuaq; remediorum colluctatione pristinae constitutioni restituatur, habita semper morbi & virium ratione. Duplex autem est intemperies: alia sanitatis, quæ paululum à media temperie recedit: altera morbofa, quæ multum ab hac, ut in hectica deflectit vberioreq; alterantium portione indiget, ut in vernaculâ constitutione fiat regressus. Quinetiâ non pauca sunt in hoc affectu sedulo perpendenda, nepe ut sepe mutentur remedia, quæ in hecticis propte incalescunt, & ne astringentia cum frigidis temere misceantur, quæ frigiditatis vim remoratur & præpediunt. Ex his liquide patet Paracelsitas novos thessalos & logodedalos in legitima huius febris, & aliorum morborum curatione omnino cecutire quæ quintâ & spirituosam essentiam quævis affectum demere sibi falsò persuadent. Etenim si febris putrida urget, molestâ putridi & corrupti sanguinis labem resarcire nequit: quippe quinta illa ficta essentia spirituosam substantiam fulcire & reficere tantum posset, simileq; simili quadâ peculiari facultate familiare esse solet.

Præterea

Error Paracelsitas

Præterea febris hectica opitulari nequit, quod hæc materia calida cordis & partiũ singularum incendium refrigerare, & humidum primigenium exhaustum reparare minimè potest, vt Paracelsus falsò contendebat.

- IIII. Purgantibus sensim & partitè per epicrasim ob virium infirmitatem, humorem peccantè, qui aut stabulatur in prima corporis regione, aut circa venas, & aliquam corporis partem vberius & contumacius inhærescit, aut cùm febris putrida simul obrepit, leui pharmaco, vt semuncia vel drachmis quinque cassiæ fistularis, vel vncia vna & dimidia mannæ electæ, vel scrupulis quatuor, vel drachma vna & dimidia rheibarbari electi infusi in decocto cichorii, endiuia, tussilaginis, scabiosæ, passularum, iuiubarum, sebestæ, thamarindorum, coriandri, hordei, & glycyrrhizæ, addito syrupo violaceo vel capillorũ Veneris. Si quidem simplici affectui simplex curatio rite congruit. At cùm morbi sunt impliciti partim consentientes, partim dissentientes, quales sunt hectica & putrida ab hoc affectu auspicanda est curatio, sine quo alterius sanatio consequi nequit, aut cuius curatio alteri neutiquam incòmodat. Tamen vrgentiori affectui altero non neglecto

At, extraordinaria & illegitima quadam curatione succurrendum est, qui quamuis sit diuturnior, ob premētem necessitatem tutior & securior euadit. In legitima verò curatione febris hecticæ & putridæ eodem negotio occurrimus, sed ea lege vt purgatio hecticę neutiquam incommodet, vires non prosternat, calorē plus æquo efferuescentem inclementius non augeat, & necessariam ventriculi concoctionem non labefactet. Si obstructio delitescit, humores crassi attenuantur, & lenti iusculis & iulepis accommodatis detergētur. Interim habenda est semper virium ratio, studioseq; prouidendum est, an hæ sint vegetæ, vel deteriores, eademque opera pars princeps affecta nempè cor roboretur, ne huius vis elanguescat, & dissipetur. Cæterum qualitas medicamenti pro natura morbi, quantitas pro magnitudine & viribus ægrotantis semper decernetur, in hocq; plurimus erit medicus, vt bellè respondeat alius.

Symptomata delentibus, quæ si imma- v.
niter excruciant, vires prosternūt, & necessariam ventriculi functionem conuellunt, ad eorum curationem præcipiti celeritate properandum est morbo paulisper intermisso, nō quatenus symptomata, sed quatenus periculosum viriū & vitę discrimen

impendet. Nā morbi in partibus, causæ in humorib. symptomata in functionib. resident, quæ ob vrgentē necessitatem certa & peculiaria exposcunt remedia. Quamuis dēpto morbo symptomata protinus & simul euanesçūt. Id genus sunt alui profluuiū, dolor, sitis, deiecta appetentia, animi deliquiū, & vigilia. Cū emergit immoderatum & molestū alui profluuiū, cum deiecta appetentia vētricus firmendus & roborandus erit, sumptis cibis euchymis gelatinis, pressis, consumptis, instauratibus cortice citri conditi, myrobalanis cōditis, diamargarito frigido, puluere coralli rubri, cornu cerui, & terræ lemnia, nec non admotis, oleo mastichino, myrtillorū cum puluere rosarum, & nucis moschatae, sacculis, & epithematib. peculiarib. Si verò causas trahit à destillatione cerebri primū fluxioni, deinde ventriculo roborando diligēter studendū erit. Cum dolor vrget, anodinis & dolorē demulcentib. opitulandum est. Cū fatigat sitis sitim minuentib. & fallentibus, vt syrupo violaceo, è limonibus occurrendum erit. Si animi deliquium irrepit pro varia causarum occurrence propulsabitur, vtpote in restauratione spirituum & copiosiore euacuatione fulciantur, & reficiantur vires, instau.

instaurantibus, gelatinis, pressis, iusculis, vino, odoribus suauibus & corroborantibus, sicuti pulueribus, margaritarum splendorum, rasuræ eboris, diamargariti frigidi, ligni aloes, cornu unicornis, seminum acetosæ, citri, confectione alkermes, syrupis è limonibus, & acetositate citri.

Facies porrò inspergetur aqua rosarum, nisi adsit molestum alui profluuium. In resolutis spiritibus abstinendum est à frictione. Si oriatur à copia & crassitie, humorum frictiones mirificè proderunt, haud aliter quàm si maligni humores hoc vitium pepererunt, alexipharmaca & frictiones vniuersi corporis decernentur. Somnus conciliabitur, syrupis è papauere, & nymphaea, è violis, diacodio sumptis cum cocleari vel aqua lactuæ, addito simul scrupulo dimidio diamargariti frigidi. Ad hunc & eundem scopum frontalia & floribus nymphaeæ, violarum, oleo rosato, & aceto componuntur. Græci ad eundem usum lotiones pedum & manuum præscribunt. In his porrò administrandis habenda est ad vnguenti temperamenti, humoris, & ætatis ratio. Nam humidi, & pituitosi, & senes, qui à pristino habitu, longius recedunt, cum eodem morbo confluantur, validiora

refrigerantia, sed pauciora & frequentius repetita postulant. Vbi autem marasmus anxie torquet, qui excitatur cum partes solidæ, membranosæ, & fibrosæ simul exarescunt, nullo præsidij genere resarciuntur, in hocq; incumbendum est, si aliquis spei relinquitur locus, ut cibis euchymis & frequentius sumptis tantum reficiantur egri. Interim medicum prudentem & prouidum in hoc se gerere sic decet, ut celerem & festum exitum necessarijs denunciet. Sequitur ordine curatio febrium, quæ in putrido humore resident.

De curatione febris continuæ. Cap. vi.

Febbris continuæ curatio septem præsidiorum capitibus continetur. Victus ratione, quæ pro varia affectus specie, diuersa temporis conditione, & viribus ægrotantis variè decernitur.

1. Cautio enim adhibenda est, ut in febre colliquescente, causo, & lipyria victus, multum refrigerans & humectans instituat: cuius generis censentur iuscula lactucæ, oxalidis, endiuia, & portulacæ, addito seminum melonum, lactucæ, & papaueris albi nodulo: quibus etiam succi limonum, citri & mali punici rite admiscantur. Hoc nomine Hippocrates præscribit in febre arden-

ardente aquam coctam, & in febre colli-
quente ptisanæ cremorem: mediocris po-
tus est salutaris in omni morbo liberalior
noxius, qui naturam à suo munere auocat,
ptisana parari potest ex hordeo decocto,
feminibus coriandri, lactucæ, cucumeris,
& radicis glyccyrrhizæ, cui tantillum san-
tali citrini simul misceri poterit. In febre
assode ab humore acri & bilioso tunicis
ventriculi infarcto contracta, hordeata ad
detergendum non ineptè exhibebuntur. In
cardiaca febre ex maligno vapore genita
femina citri & acetosæ iusculis & ptisanæ
permista eximiè conferre poterunt. In fe-
bre quotidiana continua cibus hume-
ctans, sed aliqua ex parte incidens & ex-
tenuans videtur esse porrigendus, vt pa-
natella & malsa, quam minimè improba-
runt Græci. Cæterum legitima & oppor-
tuna viuendi lex à natura & vigore fe-
bris, ægrotantisque viribus est decernen-
da. Quò enim acutior & breuior est mor-
bus, eò tenuior victus ratio est præscri-
benda, præsertim vbi vires non reclamēt.
Etenim cum elanguescunt vires, paulò ple-
nior est exhibendus victus, omniq; ope e-
nitendum & arte sic opitulandum est, vt
fulciantur vires, sine quarum obsequio ni-
hil nisi frustra moliri potest medicus. Por-

D

rò quantitas sumetur ex natura & vehemētia febris, viribus, & ætate ægrotantis, & quatuor morbi temporibus. Siquidem in principio tenuis victus: in incremento tenuior: in vigore tenuissimus exhibendus venit. Vigor enim per accidens indicat repestiuam victus rationem; per seq; prohibet tunc nihil porrigendum esse, ne natura in sæuiore affectus excandescantia à necessario concoctionis & excretionis munere reuocetur. Interim in morbis acutis, tenuis: in peracutis, tenuior: in extreme peracutis, tenuissimus victus est offerendus. Porro satietas post crīsim vt testatur historia de muliere morbo defuncta, quæ liberalius cēnata, vitabitur post interijt.

- II. Minuētibus humorē in prima corporis regione, ne sordescens humorū colluies in locū sanguinis vacuādi raptim traijciatur, & ne futuro præparationis negotio in totā corporis molē sparsim effundatur, sæuāq; symptomata infligat. Ad hanc rē accommodantur blanda medicamenta, vt semūcia vel ʒ. 6. cassiæ in bolo sumptæ vel mānæ electæ ʒ. 1. & dimidia, quæ etiā dissoluantur vel in sero lactis, & decocto cichorij, oxalidis, hordei, seminum melonū, prunorum, thamarindorum pinguium, & triū florum cardiacorum cum syrupo violaceo
vel

vel ex infusione rosarū, vel infuso rheibar-
bari electi: quæ omnia benigna medicamē-
ta ignorabant Græci, horumq; loco ellebo-
ro, peplio, & hiera picra utebantur. Cly-
steres ad eundem vsum comparari pote-
rūt ex cassia fistulari, saccharo rubro, oleo
violaceo, & decocto quatuor remollientiū
& lactucæ. Tamen à leuiorib. nō est auspi-
candum, cū brevis est morbi historia &
cū natura statim erit in procinctu.

Vacuatione quæ ex magnis vasīs humo-
rē peccantem febris continuæ sobolem
prolicat, omnibusq; affectibus biliosis &
inflammationibus præsentissimum cense-
tur esse remedium, præcipuè vbi plethora
comitatur. Natura igitur seu magnitudo
febris & viriū robur sanguinis missionem
suadent, quæ in principio administrabitur
antequā vitiosa putredinis labes inuale-
cat & facultatum attritarum firmitas elan-
guescat, ne etiam pharmacū postea sumen-
dum turgētēs humores impellat.

In plethora porro ad vasa, ad lypothy-
miam vsq; sanguinē detrahunt Græci, nisi
viriū infirmitas dissuadeat. In plethora ve-
rò ad vires paulatim parcius & partitè san-
guis effundetur. Ceterū quantitas sangui-
nis, ex primarijs indicationib. utpote natu-
ra & vehemētia febris, et egrotātis viribus

nec nō secundarijs veluti rēperamento & corporis habitu, coindicationibusq; simul perpenſis, nimirum etate, cœli ſtatu, victus ratione præcedente, immodica vel ſupreſſa vacuatione æſtimabitur. Adde quod futura actio læſa, præſens, & futura temporis conſtitutio in hoc negotio minimè prætermittentur. Non verendum equidē eſt cum Arabibus, parcendum eſſe ſanguinis miſſioni, ne eiufdem moles nimio opere efferueſcat. Nam cū vena eliditur, omnes humores præcipuè exuperantes conſertim dimanant, naturaꝗ onere humoris peccantis morbum committentis leuata reliquias minore incommodo expeditius euincet, leuiorꝗ efferueſcentiæ occaſio intus deliteſcens ſubſequetur. Itaq; in bilioſa plethora ob refrigeriū & futuram caloris extinctionē vberior: in pituitosa ob futuram cruditatē parcior detrahetur ſanguis: ambigit verò melancholica. Quòd ad vtendi modum ſpectat pro varia febris natura & partium affectarum conditione diuerſa pertundetur vena, vt interna dextri brachij ex vena caua & hepate ſiniſtri cubiti interna, ex liene promptius & validius detrahit. Quocirca in febris bilioſis interna dextri brachij: in melancholicis ſiniſtri cubiti tutò & citò ſecabitur.

Præ-

Præparatione, quæ duplex est: altera corporis, in qua laxatis & patentibus corporis meatibus, idem alimentorum & medicamentorum beneficio præparatur, ne medicamento cursus remoretur. Altera est humorum, qui nisi ritè sint apparati medicamento minimè cedunt, & in purgationis negotio graua symptomata inuehunt. Et enim tres censentur in corpore alterationes: alia naturalis, pepsis dicta perfectio à calido, naturali elixationi similis: alia est contra naturam omninò putrida, quæ nullo negotio concoqui potest, sed alteratione & excretionem indiget. Tertia est media pepasmos dicta, semi putridorum coctio, quæ, teste Galeno, bifariam suscitatur. Siquidem aut crudi sunt humores, veluti pituita acida & dulcis, cuius portio ita edomatur, vt in substantiam alimenti conuertatur: alia est admodum putrida, quæ euincitur & maturatur à natura, medicamentorumque beneficio ad excretionem aptior redditur. Id genus sunt vtraque bilis & ichores, quæ cum à natura edomantur, concocta quodammodo dicuntur: quamuis nihil in nostram substantiam facessere possit. Idcirco humores in prima & secunda corporis regione congesti apparandi erunt iusculis & sy-

rupis accōmodatis, vt exempli gratia: si bilis exuperat, commodè instituentur iuscula ex borragine, buglosso, endiuia, oxalide addendo succum citri & mali arantij. Syrupi etiā è cichorio simplici, ex acetositate citri, violacei, singulorū vncia dimidia, aquæ stillatitiæ, oxalidis, buglosi, & cichorij, singulorum vncia vna simul miscantur, & sumantur cum tabella vna diamargariti frigidi. Si humor pituitosus simul reconditur, in eodem decocto addentur radices asparagi, graminis, & folia agrimonie scolopendrie & lupuli. Cū verò humor malignus, vt in lipyria negotium facit, addentur buglossus, viola, nymphaea, succus mali citrij, cotonei, & semen oxalidis, aut liquores stillatitij, melissæ et tormentillæ. Semper equidem habenda videtur esse ratio maligni humoris & partis affectæ, præsertim principis, quæ dignitate & præstantia vniuersam corporis œconomiam moderatur. Quamobrem humores crassi attenuandi, lenti detergendi, et duri molliendi veniunt. Tenues verò concoquendi ad expeditiorem excretionem non censentur, vt in sputi expectoratione contra mentem Arabum, qui propius et per se è corpore effluunt, nisi suapte natura acres extiterint, qui tunc sunt
demul-

CONSULTATIONIBVS.

51

demulcendi, ne excernēdo molestiam ad-
ferant. Græci oximelite & mellitis ob pe-
nuriā & ignorantiam sacchari utebātur:
nunc Arabum more syrupum acetosum,
oxisaccharum & syropos accommodatos
cum saccharoq; comparatos, in febribus
continuis cōmodius instituimus. Quæ cū
ita sint legitima præparationis qualitas, p
natura humoris: limitatio quantitas, pro
copia, vsus modus, pro parte affecta, humo-
ris situ, & motu in principio tutò, citò &
iucundè procurabitur. Galenus præpatio-
nem contra suorum aduersariorum opi-
nionem in suis libris vbique celebrat, quā
breuitatis gratia libr. vndecimo, Method.
prætermisisse videtur in curatione febris
putridæ.

Purgantibus humorem sensim appara-
tum in morbo salutari, qui p humoris na- v.
tura & situ per epicrasim & partitè apparē
tibus signis concoctionis expurgatur. Nā
vt triplex statuitur concoctio, nempe ob-
scura, manifesta & perfecta: sic triplex de-
cernenda erit purgatio his respondens, ni-
mirū parca, moderata & valida, præsertim
cū putredinis labes secundam corporis
regionem obsidet. Cū verò dubius & pe-
riculosus est affectus, aut signa concoctio-
nis, quæ nec sunt, nec aderunt, ad pur-

D 4

gationem statim properandum est, vbi obferitatem affectus, & atrocitatem symptomatum deperdendæ salutis adest suspicio. Nam humor maligna qualitate præsternens, vberiore copia premens & turgens, partes principes obsidens & doloris atrocitate excrucians, in quavis corporis regione ante concoctionem (quæ frustra ob inopinatum exitium expectaretur) initio deriuandus & profligandus est. Itaque si bilis repurganda est drachma vna & dimidia, vel duabus rheibarbari, vel semuncia myrobalanorum flauarum infusis in decocto cichorii, oxalidis, prunorum, thamarindorum pinguium, quatuor seminum frigidorum maiorum, & trium florum cardiacorum: expressioni colatæ addentur electarij è succo rosarum pro exuperanti copia & virium firmitate scrupuli quatuor, aut drachma vna & dimidia, syrupi ex infusione rosarum, vncia vna, trochiscorum è caphura scrupulus dimidius: aut dissoluentur drachmæ sex cassiæ fistularis, aut vnciæ duæ manæ electæ. Pro natura enim humoris exuperantis peculiare remedij genus, pro magnitudine affectus & humoris certa quantitas, pro humoris motu & situ vtendi modus perpetuò instituetur, sed ea lege vt in ancipiti morbo medicamentum
vali-

validum præscribatur, ne mitiore medicamento & diuturniore mora totius corporis structura corruat. Cōtingit enim vt plurimum morbum blandioribus pharmacis efferuescere, viresque paulatim labascere. Interim in hoc totus erit medicus, vt purget quantum vires ferunt, & quamdiu & quousque reliquæ humorum supersint. Prætereà vtendi modus studiose est obseruādus, qui humoris semel, vel pluries purgandi opportunitatem, loci commoditatem, & ordinem regionis primæ, deinde secundæ, postremò tertiæ exhauriendæ, continet. Medicamentū verò naturæ corporis & humoris qualitate vel quantitate semper debet esse analogum.

Sudores & vrinas mouentibus post in-^{VI.}tegram concoctionem, præsertim cū o-
ciosa est natura. Vt enim medici transacto
sæuiore status tempore post euictam & cō-
coctam materiā tutò pharmacum propi-
nant, cū est ignaua natura: sic testimonijs
Græcorum & Arabum post signa conco-
ctionis, digestio legitimè instituitur, quæ
quidem duplex censetur: Nam alia est ali-
menti, anadosis dicta, quæ à facultate ar-
trastrice emergit. Altera est excremento-
rum, quæ duplex iudicatur, vna sensibilis,
diacrisis dicta, in qua vrine, sudores, & aliæ

excretiones profunduntur: altera est insensibilis, diaphorisis nuncupata, in qua per insensibilem transpiratum ex toto corporis habitu exhalant excrementa. Sudores igitur & urinae mouebuntur syrupo acetoso simplicis, capilli veneris, & è limonibus, iusculis asparagi, graminis, foliorum borraginis, buglossi, & seminum melonum simul perfuso citri succo. Quantitas pro natura & situ humoris instituetur. Præterea medicus eò usque moliri debet omne euacuationis genus ut tota morbi soboles euellatur, ne remanentibus humorum reliquijs recidiuus affectus succrescat. Græci & Arabes post signa concoctionis, balneum aquæ frigidae non improbant, cuius ope sudores, & urinae facilius cicerentur. Si natura per se id negotij aggrediatur, totum huic committendum est. Quod enim natura per se præstabit, frustra medicina tentabit.

VII. Alterantibus & roborantibus præsertim in declinatione morbi, corpore probe repurgato cordi & hepati admouendis. Siquidem ex febrili incendio empyreuma & imbecillitas perpetuò consequuntur: quæ quidem ut plurimum in eundem affectum, aut priore deteriorem præcipitant ægrum.

Vnde mirum non est, si hoc seculo non pauci

pauci ægri ob neglectum horundem præ-
sidiorum vsum in seuiorem affectum rela-
buntur, & miserè excruciantur, vixq; tan-
dem redimantur. Quocirca eò spectabit
medici opera, vt post febrem continuam,
siue ardentem, siue colliquescentem, siue
cardiacam, admoveantur cordi & hepati
epithemata refrigerantia & roborantia, in
declinatione morbi, aut in statu, cum ni-
miopere exardescit, & sæuius efferatur
affectus. Parabitur autem epithema, cordi
ad mouendum ex aquis stillatitijs, bu-
glossi, rosarum, pimpinellæ, oxalidis
& nymphææ, singulorum vncijs duabus,
addendo pulueres diamargariti frigidi,
coralli rubri, santali citrini, singulorum
drachmam vnā, et fragmentorum preci-
osorum, scrupulum vnum, croci, tro-
chiscorum è caphura singulorum scrupu-
lum dimidium, aceti vnciam dimidiam,
non dissimile ex decocto eorundem sim-
plicium componitur.

Comparabitur etiā epithema hepati im-
ponendum ex aquis rosarū, cichorij, oxali-
dis, singulorum ℥. 4. addendo santalorum,
spodij, singulorum ℥. 1. spicēnardi scrupu-
lum dimidium. Antiqui hydreleum ad-
moueabant, nunc recentiores aquam stil-
latitiam rosarum, oleum violaceum, &

acetum simul perfundunt & adhibent. Quinetiam ad hunc & eundem scopum imponitur epithema genitalibus, ex aquis rosarum, plantaginis, vino & aceto confectum. Præterea exhibebitur conditum ad robur & refrigeriū ex cōseruis nymphææ, buglosi & oxalidis, admiscēdo pulueres diamargariti frigidi, & fragmentorum cōmunium. Qua in re Græcis Arabes sunt locupletiores, qui roboris & refrigerij gratia, ob suaues sacchari delicias, sacchara, seu conseruas, condita, & tabellas ingeniosè excogitarunt. Græci olim succum rosarum propinabant, nunc posterī syrupos peculiares, vt è limonibus, & è granatis, & iuscula lactucæ, oxalidis & portulacæ cum succo limonum scilicet porrigunt. Igitur qualitas alterantium & roborantium ex specie affectus, partisque affectæ conditione: quantitas ex vehementia, & sæuitia præcedentis affectus spectabitur. Semper equidem mala qualitas tollenda, corpus imbecillum roborandum, & quod absumtum est, restaurandum venit.

VIII.

Symptomata emendantibus, quibus primum extraordinaria curatione occurrendum est, si ab horum feritate vitæ discriminē impendet, non quod morbus, & eius causæ seminaria demantur, sed quod funestā horum

iorum sæuitiam leuant. Actio enim læsa
ex morbo, excrementorum vitium, & sim-
plex corporis affectus ex actionis offensi-
one primordia gradatim acceperunt.

Cum molesta vigiliarum importunitas
egrum fatigat, somnus accersendus erit,
yrupi è nymphæa, aut è papauere fescun-
dia, stillatitij liquoris lactucę vncijs tribus
cum scrupulo dimidio diamargariti frigi-
li, quæ mista appetente sôni tēpore exhi-
bentur, vel philonis antidotus institue-
tur, si æger sit robustus. Quippe, teste Aui-
cenna, opiū imbecillis & senibus est susce-
ptum. Quinetiā admouebuntur carpis ma-
nuum, & fronti vnguentū populeum, & o-
leum rosatum cum aceto, vel capita papa-
uerum in albumine oui dissoluta, vel flo-
res papaueris, & nymphę simul permisti.
Gręci commendant lotiones pedū & ma-
nuum, quæ parantur ex decocto folio-
rum lactucę, maluę, violarię, cucurbitę,
florum nymphę, rosarum & papaueris al-
bi. Somnus etiā præcipuè conciliandus
venit, qui delirium compescit, & sitim à
ariditate profectam demulcet. Immodera-
tus verò à copioso humore cerebrum per-
fundente contractus, suspectus esse solet,
qui succo fœniculi cum aceto cocto, & o-
dorato excitabitur.

Dolor verò capitis propulsabitur oxirò-
dino fronti admoto, vel frontali ex farina
hordei macerata in succo betonicæ, & ser-
pilli, vel decocto florum betonicæ, came-
meli, rosarum, & violarum fronti impo-
sito. Celsus decernit rosas in aceto mace-
ratas. Delirium abigitur repellentibus ce-
rebro admotis, somnum conciliantibus,
frictionibus, lotionibus pedum & ma-
num, syrupis, & iusculis refrigeranti-
bus, efferuescentes vapores frænantibus.
Catarrhus compescendus est peculiari vi-
ctus ratione, reuellentibus vt frictionib. &
cucurbitulis scapulis admotis, errhinis &
catarrhum sistentibus, præsertim vbi tuf-
sis aspera, præceps suffocationis periculū,
vigiliæ & excoꝛiatio ægrum exercent. In-
terim cautio adhibenda est, repellentia,
non nisi cum religione fronti adhibenda
esse, cum catarrhus multum vrget, & mul-
ta in cerebrum confluit materia.

Cum sitis sollicitat syrupi è limonibus
violaceus & acetosus simplex cum aqua
cocta, vel ptisana, conserua symphiri &
nymphææ exhibita, & portulaca in ore
tetenta, haud dubiè opitulantur. Si suffo-
cans incendium & intolerabilis corporis
iactatio ægrum excruciant, refrigerantia
& humectantia sumpta & admota, & sari-
guis

uinis missio, si nihil dissuadeat, non
 arum conferunt. Si dolor renum & ca-
 or obrepunt, cerato santalino, & oleo
 iolaceo simul perfuso succurrendum e-
 rit. Si icterus suboritur, obstructio-
 nem tollentibus, sudores & urinas mo-
 mentibus, lotionibus & fotibus florum
 amæmeli, melilori, & anethi obisten-
 um erit. Sudores vniuersales die de-
 retorio erumpentes, febrem arcantes,
 ymptomata minuantes, & à quibus æ-
 er bene se habet, & qui facile ferun-
 ur, naturæ sunt relinquendi, nec sup-
 rimendi quoad pulsus apparebit ma-
 nus & mollis.

Si verò immoderatus eruptionem fa-
 unt, pulsusque euadit languidior, pro-
 ribus excernentur, ne ob insignem eua-
 nationem, & irruentem virium infirmi-
 tem, ad exitium inopinatum precipitet.
 qui subsistunt, aut à copia, aut à crassitie
 umorum proritandi erunt syrupis è li-
 onibus, capilli Veneris, & acetosi sim-
 licis cum ptisana, vel decocto graminis
 asparagi. Si dysenteria ægrum offendit,
 febris succedat, victus ratio peculiaris p-
 umore peccante instituetur, qui rheobar-
 aro & myrobalanis expurgabitur. Aui-
 ennas autem verè atque sapienter pro-

didit, profluuiū profluuiū causam abscin-
dendo curari, quod videtur cōfirmare Ga-
lenus 24. Aphorif. lib. 4. Præterea clystere
primū lenientes: deinde detergentes: po-
stea cicatricem inducentes sunt præscri-
bendi. Si profluuium vires prostermit, nu-
læque humorum peccantium reliquæ su-
persunt, constringendum, vrinasque & su-
dore cientibus, reuellendum est. Interim
in magna acrimonia humorum & viribus
validis narcotica non sunt omnino negli-
genda. At in materia frigida & crassa, du-
bia esse solent. Inter præsentissima reme-
dia probatur à Galeno libr. 4. de articulis
epithema, & quoduis præsidium hepar ro-
borans. Si profluuium sit pestilens, robo-
rātibus, & alexipharmacis expugnabitur.

De curatione febris ex cruditate.

CAPVT VII.

CVM febris ex cruditate sit anceps &
dubius morbus, partim ob exuperan-
tem humorum copiam obruens, & ob ma-
lignam humorum perniciem vt plurimū
prosterbens, præcipuè cū à cibis corru-
ptis primordia accepit, à naturaque euin-
ci non potuit, peculiare & tenuem victus
rationem exposcit. Magnus autem & an-
ceps est morbus ex se, qui aut partes prin-
cipales

cipes, aut à corde non remoras, aut acutiore sensu insignitas occupat, vires conuellit, vtrumq; calidum fixum, & influens obterit. Quinetiam magnus ratione causæ nuncupatur, qui ob exuperantem humorum sarcinam omnes partes nobiles & ignobiles obruit, & ratione symptomatum fûctiones vitæ necessarias labefactat. Tamen æger non est vsque adeò deperditæ sanitatis, quin adhuc aliquis curationi relinquatur locus, quæ octo remediorum capitibus comprehenditur.

Victus ratione tenuante, quæ pro vberiore cruditatis prouentu humorē crassum & crudum attenuat, sensimq; corpus tanto onere cōfertum leuat, simulq; vires fult. Eò igitur dirigetur consilium, vt viriū ratio habeatur, harumq; subsidio sensim & pedetentim humorum impuritas absumatur, siue in prima, siue in secunda, siue in tertia corporis regione deliteſcat. Vires porrò languidæ, vel integræ internoscuntur functionibus animalibus, nempe sensuum & motus firmitudine, aut infirmitate, vitalibus vt pulsu magno, vehementi, aut paruo, & languido, & naturalibus, nempe signis coctionis vel cruditatis. Itaque si pulsus est magnus, satis vehemens & laudabilis, aliquodque concoctionis signum

E

in vrinis se prodat, certissimum est argumentum naturam victricem esse, tenuissimoque victu fulciri posse. Cum verò pulsus apparet parvus, languidus, vrinaque omninò confusa permanet, certò colligendum est naturam, aut admodum oppressam, aut prostratam esse. Quocirca primum artis votum erit naturam fauentem habere, eiusque motum & progressum imitari, vt æger legitimis & tempestiuis viuendi legibus redimatur. Si enim vires non admodum sariscunt, parciore victus ratione fruetur, à concoctionisque officio minimè reuocabitur natura. Instituentur autem panatella, & iuscula pulli, capi cum thymo, hyssopo, petroselino, buglosso, asparago, & ciceribus rubris. Cum vires infringuntur gelatinæ, consumpta, instaurantia, & omnes cibi euchimi parca manu multum nutriendos conferre poterunt. Potus erit aqua cinamomi, aut hydromel, in quo decoquantur eupatorium, betonica, gramin, hyssopus, & stæch. Post victoriam morbi, prouidendum est, an empvrea, an siccitas, an macies, an imbecillitas, an humor excrementitius adsint: quibus statim succurrendum est ea lege, vt quæ longo tempore extenuata sint, lentè, quæ breui

breui, breuiter reficiantur. Porro hoc
in loco silentio non est prætereundum,
rudum, autore Galeno Comment. secun-
do in libro de ratione victus in morbis a-
cutis cap. quadagesimo quarto, manere
norbum ob inædiam longam vel intem-
pestiuam cibi oblationem.

Minuentibus humoris illuuiem in ve-
nis meseraicis congestam, aut catapotijs
ex hiera, aut diaphœnici, vel electarij in-
li vncia dimidia, vel drachmis tribus, cum
yrupi, capilli Veneris drachmis sex, hy-
dromelite, vel decocto pectorali in quo
bullierint polipodi quercini, follicu-
lorum fennæ cum aniso, singulorum dra-
chmæ duæ. Non parum etiam opitula-
untur clisteres ex decocto carminatiuo,
& remollientium, addendo diaphœnici,
hieræ picræ singulorum vnciam dimidiâ,
nellis rosacei vnciam vnam, olei lilio-
rum & camæmeli singulorum fescûciam.
Attenim cum ingens humorum crudorum
ventina calorem innatum suffocat, proti-
us exhaurienda venit, antequam natu-
ra tanta mole obruatur, ne etiam exupe-
rans humorum fœnus in prima corporis
regione cumulatius retentum, apparan-
do in secundam deuehatur, affectumque
eminet.

E

Præparantibus humorem crudum concoquendo, lentum detergendo, crassum attenuando, durum molliendo, & meatus constrictos aperiendo. Primum crudus humor concoquendus est medicamentis, calori nativo non admodum imparibus: id genus sunt syrupi à mentha, & à corticibus citri qui calore temperato nostrum recreando, & augendo concoctionem iuvant, & resoluendo incrassant. Duæ equidem censentur causæ genitrices crassitie, nempe calor & frigus. Quæ enim à frigore & astrictione concreta sunt, crassa incidenda, & lenta detergenda se offerunt. Cuius ordine sunt oximel simplex, mel rosaceum, syrupi à duabus & quinque radicibus, & à bizantijs, aquæ fœniculi, hyssopi, eupatorii, hydromel in quo decoxerunt radices asparagi, graminis, polipodi quercini, folia scolopendriæ, capillarium, et chamædrios, & iuscula petroselini, hyssopi, thymi, buglossi, capparorum, & passularum corinthiarum seu damascenarum. Dosis verò syruporum est, ut plurimum aut sescunciæ, aut unciam duarum, & decocti trium unciam. Præterea non solum sumptis, sed etiam admotis rite apparatus humores sacculis hippochondrijs, & ventri admouendis, qui concinnabuntur

tur ex radicibus asari, brionię, corticum capparorum, thamaricis, folijs absynthij, chamędrios, eupatorij, fumarię, peucedani, centauri minoris, floribus camęmeli, meliloti, genistę, saluię, & iunci odorati: quibus addi poterunt semina agni casti, & fęnigręci. Interim eò spectabit opera, vt perpetuò à leuioribus auspicetur, sensimque obstructio funditus extirpetur, quę impeditam transpirationem, prępedita transpiratio putredinem, putredo febrem sensim ingenerat.

Purgantibus humorē pręparatum, qui i v. febrem fouet, & per epicrasim, vt natura aliqua humoris portione leuata in reliquias expeditius incumbat. Medicamentum blandum et lene exhibendum erit, ne diarrhęa, aut cholera morbus statim irruat. Infundatur autem rheibarbary electi scrupuli quatuor, agarici trochiscati scrupuli duo, cinamomi optimi scrupulus vnus in decocto pectorali, in quo ebulliāt folliculorum senne cum aniso, vel caryophilis drachmę duę, & syrupi capilli Veneris drachmę sex simul perfundantur. Si vires non reclamarent, diaphęnici drachma vna dissolui poterit. Quocirca quantitas purgationis proportionem magnitudine, viribus ægrotantis, constitutione corporis, humoris & cęli, vsus

modus pro affecta parte nec non pro humoris qualitate, quãtitate & situ decerneretur, ne pharmaco parum dextre exhibito æger cum morbo extermineretur.

v. Vacuantibus nimirum sanguinis missione cum fœdum morbi seminarium secundam corporis regionem occupat, plethorãq; ad vires, & ad vasa opprimit. Nã sicuti cacochimiæ purgatio, sic plethorę sanguinis missio congruit, quæ in hoc affectu nimio opere vrget. Itaq; sanguis mittendus cesseret, sed ob periculosam cruditatis labem minori copia exhaurieretur, semperq; viriuratio habeatur. Siquidẽ pro magnitudine morbi, & virib. ægrotantis, tanquã primarijs indicationib. sanguis parcius, vel vberius detraheretur. Quod verò Gal. in febre pituitosa, & epiala cruditatis ratione venã non pertũdit, hoc p̃stat, cum non sollicitat plethora, & ob virium imbecillitatem, in febre syncopali neq; purgat, neq; euacuat, *3. in libr. id. c. 48.* sed tantũ frictionem adhibet. Non enim eodem authore sanguis detrahendus est in illis, in quibus in alium humorem insigni mutatione conuersus fuerit. Quod reliqui spiritus quibus fulciuntur vires, simul euanescent. Cum verò vires adsunt validæ, Arabes & Græci, recentiores in febre syncopali à pituitoso humore genita, ad humores

mores præparantia blanda pharmaca, & frictiones non temerè confugiunt. Si ventriculus & venæ meseraicæ crudorum humorū prouentu sordescunt, medicinā potius quàm sanguinis missione conferre apparet. Quandoquidē medicamentū caco-chimiæ expurgandæ accōmodatū, ex prima corporis regione exuperans, cruditatis fœnus faciliè extrudet. At sanguinis missio cō non pertingit, hancq; cruditatis sentinā ad magna vasa attraheret, affectumq; priore deteriorem infligeret.

Vrinas & sudores mouentib. vt humor, q v i. in secunda corporis regione reconditur, p loca conuenientia deriuetur, utpote iusculis graminis, asparagi, & petroselini, auc hydromelite, in q flores stœchados, & betonicae, & hæc simplicia medicamenta cōmemorata simul incoquētūr. Interim omne studiū in hoc collocabitur, vt excrementa fuliginosa per corporis habitum deuoluta, per insensilem transpiratum, opportuna frictionum ope excernantur.

Roborantib. vt conseruis betonicae, capillorum Veneris, confectiōe alkermes, v i i. cortice citri conditi, tabellis electarij aromatici rosati, diagalanga, & dianiso, & oleo nucis moschatæ, quo inūgetur vētriculus. Danda semper erit opera, vt ventri-

culi & hepatis ratio habeatur, ne ventriculi attritio suboriat, in qua chylus ante excretionem in pituitam facessit, atrociorumque symptomata profert: quorum meminit Galenus in lib. de præsignatione ex pulsibus. In hoc enim affectu ventriculum post pedes calefactos oleo nardino inungit, vinumque generosum propinat. Nunc recētiore medici puluerem galangæ, aut piporis cum pane azimo inuolutum, & aqua vini stillatitia cōposita tutò & incundè porrigunt. Parabuntur linimenta pro regione ventriculi ex oleo nucis moschatæ, & pro liene oleis è genista, & è capparibus.

II X. Symptomata delentibus, vt lienteriam, quæ si contrahatur ab imbecillitate, alteratricis & retentricis facultatis corroborantibus præsijs, & astringentibus vtendum erit. Si cæliaca affectio negotium facessit, & ab obstructione venarum mesaricarum proficiscatur, primo loco humores erunt minuendi, sensim præparandi, & euacuandi. Quando ab imbecillitate hepatis causas trahit, roborabitur æger sumptis & admotis, intemperiesq; simul oblitterabitur, ne nouus humor succrescat. Cùm diarrhœa fatigat, & est critica & perfecta, naturæ relinquenda venit, viresque interim fulciatur, & reficiantur. Si imper-

fe sta

fecta obrepit, iuuanda est, humorq; peccans per epicrasim deriuandus est. Pro ceteris causis aliâs suo loco curatio instituetur. Haëtenus febrium curatione perstrinxi, quarum causæ in vniuerso corpore, præsertim in mole sanguinis resident. Nunc perscrutandæ veniunt febres symptomaticæ, quæ in partis alicuius inflammatione, aut humore circa aliquam partem inarcto, aut corruptela eiusdem consistunt.

De Curatione febrium symptomaticarum.

CAPVT VIII.

FEbris symptomatica ab inflammatione genita, primo loco excutienda est, quæ octo remediorum capitibus oblitterabitur.

Victus ratione tenui, refrigerante & humectante, fluxionemque prohibente, quæ pro magnitudine morbi quatuor eiusdem temporibus, & viribus ægrotantis variè præscribitur. Quò enim acutior & sæuior est inflammatio, eò tenuior viuendi lex decerneretur. Quinetiam pro varijs quatuor morbi temporum periodis diuersa victus ratio decernitur. In febrium enim essentialium principijs tenuis victus, in incremento tenuior, in vigore tenuissimus

exhibetur: quod in vigore iudiciū expetatur, tuncq; natura ab vrgentiore concoquendorum, & expellendorum humorum negotio non est perperam distrahenda. Verū in febribus symptomaticis alio modo cibus porrigēdus est, nimirum in principio tenuissimus, vt partes singulę humorem superfluū auidius retineant, præcipitem & effœratum fluxionis impetū coerceant, inflātionemq; febris symptomaticę sobolem imminuat. Fluxioni equidē admissæ, quā admissuræ ægrius occurratur. Igitur in principio huius febris symptomaticę tenuissimus victus porrigēdus venit, vt pruna elixa, hordeata: deinde in incremento & vigore, iuscula, panatellæ ex pane loto confectæ, gelatinæ, & instaurantia, vbi vires elanguescunt & nimio perē atteruntur. Cū enim vires fatiscunt, paulo pleniori victu videntur esse reficiēdi ægri. Interim habenda est ratio partis affectæ, quam inflammatio obsidet. Etenim si pars princeps, aut huic finitima, aut publicum munus obtinens, aut sensu acutior prædita, victus tenuior parū tutus est, sed paulo plenior instituendus, simulque protinus ad roborantia festinandum est. Sunt equidem partes principes, iudicio Arabum, roborandæ & conseruandæ, quæ digni-

dignitate præstant, vniuersum corpus moderantur, ex earūq; insigni offensione præceps, & inopinata vitæ euerfio imminet. Aliæ publicū munus corpori sustinendo necessarium obtinuerunt, vt ventriculus: aliæ parti principi sunt vicinæ, quæ ob cōsortium simul afficiuntur, vt inflammatio auris, cerebro, pulmonū, cordi promptè communicatur: aliæ sunt exquisito sensu insignitæ, veluti diaphragma, vterus, vesica, & orificium ventriculi, quibus inflammatis & legitima victus ratione, opportunisque prædijs haud cunctanter succurrendum est. Prætereà aliæ sunt remotæ à partibus principibus, sed excrementis excipiendis dicatæ, sicuti intestina & renes. Pro quarum partium varia inflammatione, varia viuendi lex & remedia imparia adhibebuntur. Nam cum infirmitas accedit ad partis principis inflammationem, aut publicam functionem obtinentis, aut sensu acutiore donatæ res magis in difficili & in dubio esse colligendum est. Cum autem inflammatio ventriculum aut hepar obsidet, victus tenuior est exhibendus. Porro vigilia in inflammationibus internis, somnus in externis commendatur.

Minuentibus humorem in prima cor. II.
poris regione cumulatū, ne pars inflam-

matione affecta humores in corpore redū-
dantes calore & dolore proliciat. Cliste-
res ad hunc vsum accommodabuntur, qui
à parte affecta humores excremētitos re-
uellant. Tamen abstinendum est à validis
pharmacis in principio inflammationum,
ne humorem turgentem exagitent, in par-
tem conflictatam præcipitent, & calorem
augeant. Quinetiam sunt parum tuta phar-
maca in inflammationibus partium prin-
cipum, & præsertim in inflammationibus
pulmonum, pleuritidis, & partium vita-
lium, quæ corpus imbecillius reddunt, &
euacuationem, quæ per sputa fieri debet,
remorantur, & præpediunt. Nam in inflā-
mationibus partium, aut paulatim excer-
nitur materia, vt in pleuritide, quæ per lo-
ca conuenientia deriuanda venit, aut pau-
latim resoluitur, quæ peculiaribus subsi-
dijs iuuāda est, aut in suppurationem mu-
tatur, cui arte opitulandum est.

- III. Reuellentibus & vacuantibus, quæ ef-
fœratam irruentis sanguinis incursionem
compescunt, plenitudinem detrahunt, &
partem affectam aliqua putrescētis humo-
ris portione subleuant. Vacuatio enim san-
guinis & humoris in corpore præter natu-
ram contenti, reuulsio & depulsio procū-
bentis eiusdem in contrariū retractio pro-
prie

prie definitur, quæ recto venarum & fibrarum cursu è regione partis affectæ ex ampla, & vicina vena, & in principio administrari debent. Siquidem ex ampla vena vberius, ex vicina celerius & validius effunditur sanguis, nimirum ex vena humerali, seu cephalica ex partibus, quæ sunt supra clauiculas, interiori ex his, quæ inter clauiculas & renes, media ex vtraque parte vberius, validius & commodius reuellût. Si profectò inflammatio malè habet cerebrum, vt sphacelismus cerebri, phrenitis, inflammatio aurium, angina, fauces, humeraria, inflammatio pulmonum, pleuritis, media, sicuti ea, quæ diaphragma, ventriculum, renes, intestina, vterum, vesicam & scrotum exercet, resignanda est vena. Si tamen aliquid maligni in vtero lateat, quod ex lue venerea contractum sit, vena malleoli aptius pertundenda venit, ne contagiosa veneni labes in venas maiores, & in totum corporis habitum retrahatur. Semper igitur è directo partis affectæ ex vena ampliore & viciniore demetur sanguis. Post harum venarum sectionem sedato fluxionis impetu in affectibus capitis vena frontis, aut puppis, & cucurbitulæ cû scarificatione scapulis admotæ, in aurium inflammationibus, vena sub aures, in angina

quæ sub lingua apparent, non aliter quàm in affectibus renum, vteri, vesicę, & scroti venę malleoli, aut poplitis commodè aperientur. Etenim cùm æger plethora laborat, & effrænatus est fluxionis impetus, venę superiores ad reuulsionem sunt secāde, ne humor ferociens, quū natura moderari res nequit, meatumq; ad exeundū nō nanciscitur, præcipiti motu in partem affectam irruat. Cùm verò iufluxit materia venę poplitis & malleoli, tutius referendæ erunt. Quantitas porrò sanguinis mittēdi ex magnitudine morbi, viribus ægrotantis, temperamento, habitu, & ætate eiusdem constitutione cœli, vacuatione præcedente, viuendi genere, rerum externarum futura occurratōne, & symptomatum futurorum sæuitia perpendenda veniet. Non enim minore cautione prospicienda sunt futura, nempe cœli constitutio calida, vel frigida, victus ratio parior vel liberalior, symptomata, utpote vacuationes immodicæ, & excrucians dolor, quæ largiorem sanguinis missionem dissuadent, ne vires necessarias nimio opere prosterнат, noxiōque aut in tempestiuo victu penuriam reparare in egri perniciem nos postea cogat. Hoc nomine Hippocrates & Auicennas in pleuride

pitide biliosa sanguinem non demebant, solisque fomentorum præsidij affectum expugnari posse sibi persuadebant, metuebantque austro perflante euacuationem in pleuriticis apud Athenienses parum tuam esse. Idcirco in principio febrium symptomatarum & essentialium sanguis est mittendus, ut aperte confirmarunt Greci contra mentem Arabum, antequam invalescat morbus. Hippocrates in plethorico corpore & viribus validis, usque ad animi deliquium sanguinem vacuat. Iterata verò vacuatio in viribus elanguescentibus magis à Galeno probatur. Quamobrem in omni inflammatione profliganda desiderantur, vacuatio & reuulsio, quarum una celebratur, cum partes incolumes sanguinem vacuatione, ligaturis, & frictionibus subtrahunt: altera de qua mox differendum est, sanguinem depellit, & transfert ad alia membra, ut in principio inflammationum astringentibus remedijs utimur, quæ humores à parte affecta protrudunt.

In hoc sanè affectu, authore Galeno, exiguus humor ante purgationem ad magna vasa commigrat, minimumq; malum committit, quod facile à natura euincitur, nisi corpus fuerit plethoricum.

Repellentibus humorem profluentem in partem affectam mediocribus subsidijs ne nimio opere repellentia scyrrum ingenerent, aut partis præcipue principis temperiem immutent, aut humorem crasfiorem reddant, & alius impingant, aut per accidens caloris feruorem augeant. Vacuatio igitur, vt placuit Galeno, aut sit per translationem, cum repellentiũ ope humores in alias partes stante fluxionis principio auertuntur, qui ob nimiam horum copiam in magna vasa traiciuntur, natureque beneficio sine aliquo detrimento edomantur: Altera est cum partes incolumes sanguine euocant ligaturis et reuulsione de qua mox disputatum est. Quamobrem in principio inflammationis ad mouenda erunt parti inflammationem malè habenti, cuius conditio præstantia, sensu exquisito, vel hebeti, situ & cõformatione æstimata ad vnguentum perpendetur. Nemo equidem nescit omni parti inflammatae eadem remedia localia non æquè congruere. Siquidem partes principes & exquisito sensu insignitæ mitiora postulant remedia, quibus vt verè censerent Arabes, admiscenda sunt roborantia & parti familiaria, veluti hepatis, cichorii & eupatorium, corallus, & spodium, liceni asplenium, & scolopendrium, cerebro
rolæ

rosę, thoraci tus silago, & scabiosa apte præscribentur. Itaque repellentia in phrenitide & spaciismo accommodata sunt, succus rosarum, & acetum, conserua rosarum & earum succus, oleum rosatum & acetum cum caphura permistum, quę syncipiti & fronti admouebuntur. In inflammatione hepatis succus solani adhibitus nō parum confert. Tamen Arabes & Græci inter se dissentire videntur quōd illi refrigerantia, vt succū solatri in principio inflammationis adhibent. Græci verò relaxantibus, & roborantibus ad refrigerium robur, & ad discutiendos vapores, nempe rosis & absinthio in oleo & aqua decoctis vtuntur. Sed hi non discrepant cū ordine immutato in eundem scopum contendant. Præterea modice frigida ad vitandā obstructionem sunt præscribenda, cuiusmodi sunt syrapi cydoniorum, & rosatus perfusi cum his, quę modice aperiunt & detergunt, vt decocto agrimonie, oxalidis hepaticę plantaginis & cichorii. Non parū prospero & felici euentu imponentur epithemata ex aquis rosarū, solani & plantaginis confecta, & sacculi ex rosis, balauistiis, spodio & santalis concinnati. Olea porro videntur esse in omniū partiū inflammationibus, præcipue hepatis parū tuta,

F

ne promptè incalescant. Præterea singulari cautione obseruandū est, ne in angina, pleuritide, & inflammatione mediastini repellentia inducantur, ne humorē peccantē ad partem inflammatione affectam intro concitent, sed tutius & commodius lenientia & resoluentia præscribentur. In principio verò anginae, cū in fauces irrumpit sanguis gargarismi refrigerantes, & astringentes decernendi erunt. In aliis verò inflammationum generibus subsidio repellentiū tutior fit retrocessus, qui etiā vel attracta vel transmissa materia in omni inflammatione dextrè administratur.

- v. Materiam apparantibus, quæ pro singulis partibus vitiatis, humorum naturā, eorumque sedibus variè adhibetur, vt exempli gratia: Si inflammatio ad hepar obrepit, præparantibus, coquentibus & astringentibus ad partis affectæ, natura laxæ robur, & aperientibus simul mistis præparatio procuranda erit, nempe syrupis è cichorio, è ribes, ex oxalide, acetoso simplici, & rosato, cū humor biliosus mali causam dedit. Si verò humor pituitosus sit huius morbi seminarium, oximel simplex, mel rosaceum, & syrupus capilli Veneris legitimè & cōmodè instituentur. In angina pituitosa humor oximelite simplici, & mel-
- le ro-

le rosaceo cum aquis betonicæ, & absyn-
thij apparandus venit, & biliosus detergē-
dus, alterandus, & protinus educendus
censetur. In pleuritide biliosa, syrupi vio-
lacei, & è iuiubis, in pituitosa syrupi capil-
lorum Veneris, è glycyrrhiza, & è scabiosa
eximiè conferre creduntur. Idē statuendū
erit de aliorum humorum præparatione.

Purgantibus humorem exuperantem, vr.
præcipuè cum febris essentialis simul cum
symptomatica implicita est, aut cum hu-
mor vitiosus primam corporis regionem
occupat, ad quam pertingere non potuit
venæ sectio, aut cum febris incendio reli-
quæ humorum supersunt, quæ nouam fe-
brem minantur. Etenim in febre sympto-
matica summa cautione prouidendum est,
an copuletur febris essentialis, vt huius se-
minarium victus ratione & pharmacia ex-
tirpetur. Quinetiā si humor peccans deli-
tescit in prima corporis regione, aut malè
aliquā partem affectat, & habet, quam de-
mere nō potuit, sanguinis missio leui phar-
maco, præsertim morbo inclinante, & quā
longè fieri potest à parte affecta vtiliter &
cōmodè eximendus est, q, minimè videtur
improbare Gal. 13. Method. & Hipp. in curā-
da pleuritide, quæ ad hypochondriū vsq;
extenditur. Præterea omnes Medici Græci

& Arabes gibbam hepatis diureticis, cauā clisteribus, & blandis medicamentis repurgandam esse contendunt, vt cassia, manna, & rheobarbaro. Cæterum eò spectabit opera, vt à parte affecta purgationis ope reuellatur humor, veluti exempli gratia: si renes inflammatione confligentur, clisteribus, & leui pharmaco, si intestina, diureticis deriuabuntur.

- vii. Digerentibus materiam relictam, siue in pleuritide, siue in angina, siue in phrenitide, & in alia quauis parte inflammata: quæ peculiaria requirit remedia. Etenim in angina nidus hirūdinis frixus cum pinguedine & parti laboranti impositus, in pleuritide, muccago seminis lini, scenigræci, oleum camameli, & amigdalorum dulcium foris adhibita, sicuti intus sumpta dens apri, priapus cerui, corallus, flos, aut radix lappæ, & testæ auellandarum rubrarum cum hydromelite ex scabiosa, tussilagine, passulis, iuiubis, sebestem, floribus violarum, & stœchados, paratò conferre creduntur. Quocirca pro varia singulorum temporum mutatione varia sunt instituenda remedia, vt in principio fluxionis astringentia, & repellentia, in incremento resoluentia, & digerentia, & parum astringentia: in vigore anodina, & digerentia: in declina-

clinatione pura digerentia sunt instituenda: quæ via optatior est quàm ea, quæ suppurantibus tentatur. Galenus non videtur contra suorum aduersariorum opinionem roborantia & astringentia cum digerentibus ob maius commodum, quàm incommodum futurum, in discutiendis parvis principis tumoribus perperâ adhibere.

Suppurantibus inflammationem, quæ IIX.
nullo euinci artificio potuit, utpote in angina emplastro seminum lini, fœnigræci: in inflammatione hepatis cataplasmate ex decocto maluæ, & absynthij comparato. Abscessus rumperetur sternutamento, aut in angina cultro ligneo, aut sponsia cum filo alligata. Vlcus porro detergetur melle rosaceo & decocto hordei, & tandem glutinabitur terra Lemnia, bolo armenio, & sanguine draconis. Interim detergetur humor per proprios & breuiiores meatus, per quos natura solita est sua excrementa deponere. In suppurando emplastica admoventur, ut calor innatus influentis comes felicius materiam euincat. In febribus verò putridis pori semper referantur, ut humor putris & fuliginosa excrementa foras euocentur.

Intemperiem emédantibus sumptis & IX.
admotis, ut in inflammatione vetriculi &

hepatis, tabellis trium santalorum, & diama-
margariti frigidi, conseruis & conditis ro-
sarum, & buglossi, & admotis epithemati-
bus, & sacculis accommodatis, & in phre-
nitide, lotionibus pedum & manuum, &
frontalibus peculiaribus capiti admotis,
& sumptis, nempe syrupo è nymphaea, &
dyacodio ad somnum accersendum, & in-
temperiem obliterandam. Si febris sym-
ptomata ab exuperanti putridorum hu-
morum prouentu circa partem aliquam,
præsertim principē inhærentē proficisca-
tur, victus tenuis & tenuēs primo loco in-
stituetur: deinde humor excrementitius
repurgandus est, vt expeditior & tutior ri-
uulis exhaustis ad fontem mali progressus
fiat. Si corpus plethora laborat, vena è re-
gione viciniore partis affectę resignabitur,
vt optatius curationis votum cōsequatur.

Si verò corpus non sit plethoricum, ha-
benda erit potius ratio humoris corrupti
circa partem cōgesti, qui mali initium de-
dit. Non enim ex veris artis legibus medi-
cinam facit, qui relicto impuro humore fe-
bris symptomaticæ fomite, syncertum san-
guinem incōmodè & inutiliter detrahit.
Itaque humorum sentina circa partem af-
fectam cumulata, ordine & sensim appa-
rabitur, & expurgabitur. Cùm enim, ex-
em pli

empli gratia, humores circa hepar infarciuntur, syrupis è cichorio, capillorum Veneris, oxymelite simplici cum decocto radicum graminis, filicis, asparagi, foliorum agrimoniae, scolopendrij, cassuthæ & lupuli, & sacculis accommodatis parti affectæ admotis præparabuntur. Postquam appa-
rati fuerint medicamêto peculiari, pro humoris putrescentis situ purgante euacuabuntur, veluti rheobarbaro & agarico trochiscato. Postremò hepar cõditis, tabellis, & epithematibus ad hoc negotium facientibus roborabitur. Si verò febris symptomatrica primordia accepit ab vlcere, hoc primum detergendum est, vt exempli gratia, vlcus pulmonum lacte asinino, decoctis & syrupis peculiaribus eluetur, suffribusque, & alijs proprijs remedijs tandẽ glutinabitur. Si verò à partis principis corruptela febris symptomatrica causas trahit, hæc mortifera affectus sæuitia nullis machinis expugnari potest, sed rem in angusto esse certò portendit, quæ amicis & necessarijs indicanda est. Deplorati enim & deperditæ sanitatis ægri non sunt attingendi, ne ars temerè infametur. Quod aut pars absoluta putredinis labe vitiata nullo subsidio redimi potest, apertè confirmarunt Hipp. & Gal. his Aph. quibus cerebrũ



syderatum est, intra dies tres intereunt: si verò hos superauerint, sani fiunt. Et aliò Aphorismo, quibus purulentū iecur adurit, si purum pus effluat, & album, salui fiunt, in tunica ipsius pus continetur: si verò qualis amurca profluat, intereunt. Nam teste Galeno, quibus est in tunica pus illiusa iecoris substantia omnes seruantur. Quibus verò in carnem vsq; iecoris corruptio penetrat, hi bona ratione moriuntur. Febris cōtinuis ita discussis, nunc febres intermittentes excutiendę erunt, exordio sumpto à curatione quotidianę.

De Curatione febris Quotidianę intermittētis.

CAPVT IX.

QVamuis omnes febres intermittentes sint curatu faciles, si pro vernacula vniuscuiusque humoris morbum committentis peculiari eiusdem sede & parte affecta certa remedia dextrè & oportunè adhibeantur. Tamen ob differentiam singulorum humorum segnius discussam, focum eorundem ignauius perspectum, partem affectam præcipuam horum effectricę imprudentius neglectam, & periculosum frugiferę methodi contemptum, sunt vt plurimum diuturnę, aut mortiferę. Quo-
circa

circa vt res exemplis dilucidius illustratur, exordiar à varijs febris quotidianæ feminarijs, quæ pro natura & differentijs pituitæ, diuersas eiusdem febris species promunt. Cum enim humor pituitosus salus quotidianam ingenerat, perniciosior putredinis labes, magis molesta sitis, horror vehementior, urinæ ruffæ & velocior pulsus, quàm in cæteris pituitæ differentijs perspicuè apparent. Cum acida pituita febrem quotidianam peperit, nulla sitis, sed fames & frigus, sicuti cum dulcis est eiusdem fermentum, magis sopor comitatur. Huius porrò febris scaturigo circa ventriculum & venas meseraicas penitus residet, vt in libr. de febribus latius disputatū est. Quod ad partem affectam spectat accusandus videtur esse ventriculus, vt Græci & Arabes vno & eodem cōsensu probauerunt, certa quæ experientiæ fides commonstrauit. Quæ cum ita sint pro varijs pituitæ non naturalis febrem quotidianam inuentis speciebus, eiusdem foco & parte affecta legitima victus ratio & tempestiua remedia instituentur. Igitur huius febris curatio septem remediorum capitibus continebitur.

Victus ratione quæ pro varia pituitosi humoris natura variè instituitur, vt in pi

ruita salsa magis refrigerans & humectās,
& minus incidens, quā in alia pituitæ spe-
cie, magis attenuans & incidens in acida,
magis temperatus in dulci ritè decernetur
Cui victus decreto minime reclamatione Gale-
nus: quippe varias pituitæ non naturalis
differentias minime ignorauit, pro cuius
indicationibus magis vel minus attenuan-
tia, siue alimenta, siue medicamenta neu-
tquam improbauit. Idcirco in principio
morbi magis coquentibus, & in augmen-
to post tenuē humorem expurgatum, in-
cidentibus & attenuantibus, pro varia hu-
moris natura magis vel minus opitulandū
erit. Post intemperantiam & ingluuiem
in principio febris quotidianæ tenuior
victus erit præscribendus, vt natura noui
alimenti appulsu minime præpedita libe-
rius concoctioni indulgeat. Vfus porro
modus, & occasio cibi exhibendi in indu-
cijs & intermissionibus febris ad legitimū
concoctionis tempus studiosè observa-
buntur. Quocirca his stabilitis, æger pri-
mum fruetur aëre puro ad calidum & sic-
cum inclinante, vel industria sic parato.
Cibi erunt euchimi, incidentes, & exte-
nuantes magis vel minus pro humoris na-
tura, non admodum calidi, si Auicennæ fi-
des adhibenda est. Id genus erunt panatel-
la, iu-

la, iuscula, capi, pulli, carniū hēdinarum, petroselino, hyssopo & thymo alterata, pressa, & consumpta, & contusa carniū delicatarum. Potus erit vel hydromel cinamomo probè aromatizatum, vel aqua cinamomi & sacchari, vel ptisana cum hordeo, coriandro & cinamomo comparata, vel vinum oligophorum. Interim in principijs accessionum à somno sunt expurgiscendi ægri, in vigore potu sudores mouendi & in declinatione eliciendi. Porro victus ratio instituetur semper iure ex virium perspicientia, & loco, vt ex accessionum inducijs.

Minuentibus excrementitium tenuem & ad excretionem facilem humorem, aut diaphœnici, aut hieræ picræ, aut electarij indi maioris drachmis tribus, vel semuncia, quæ bolo cum pane azimo, vel dissoluta cum hydro melite bene cum cinamomo vel agallocho aromatizato, vel decocto pectorali exhibebuntur. In eundem scopum præscribi poterunt catapotia, quæ ex pillularum, hieræ simplicis scrupulis duobus, agarici trochiscati scrupulo vno, cū oximelite, vel decocto sarsæ parillæ vnita ornamabuntur. Clysteres etiā ex decocto carminatiuo & remollientiū cōparati probabuntur, cui addentur diaphœnicum, hiera

picra, mel rosaceum, & oleum liliorum, & camameli. Quocirca minuendus erit primo loco humor, qui in vetriculo & venis meseraicis residet, vt oneris portione leuetur natura, tutiorque præparatio postea procuretur. Ab agarico abstinendū est nunc qui in principio humores exagitat.

- ¶ 11. Apparátibus humorem crudum & dulcem concoquendo, crassum attenuando, lentum detergendo, & durum molliendo. Id genus censentur syrups à mentha, à corticibus citri, & ex absynthio, qui concoctionem iuuant, & calorem nostrū augent, necnon incidentes & detergentes, nempe oximel simplex, mel rosaceū, syrups à duabus & quinque radicibus cum decocto eupatorii, chamædis, hyssopi, & fœniculi perfusi. Interim habenda erit ratio humoris peccantis febrem infligentis, vt si pituita acida, & vitrea exuperat, magis coquantibus, attenuantibus, & detergentibus, pituita dulcis minoribus, & clementioribus horū præsidij, salsa minus calidis, coquantibus & incidentibus præparabitur. Cū enim varij existunt incidentium & attenuantium ordines, varia pro humoris peccantis calore & crassitie accommodabuntur remedia. Qualitas igitur præparantiū pro humoris natura & crassitie, quantitas
pro

pro copia & crassitie, vsus & occasio exhibendum in accessionum inducijs vtiliter & commodè administrabuntur. Galenus & Auicennas vno & eodem ore confirmant in principio febris à multum calidis & incidentibus abstinendū esse: quandoquidem ratum est axioma à leuioribus semper auspicandum esse. Præterea in hoc plurimus debet esse medicus, vt cogitet de remedijs extrinsecus admouendis, quæ ad affectum eximendum non parum faciunt. Sacculi autem regioni ventriculi, & venarum meseraicarum admouendi comparabuntur ex absynthio, saluia, mentha, thymo, betonica, synfibrio, radicibus cyperi, calami aromatici, corticibus citri, maceris, seminibus anisi, cumini, fœnigræci, floribus camameli, meliloti, geniste, & anethi, quæ decoquentur in aqua addendo mediam partem vini generosi. Fit verò coctio contra aduersariorum Galeni mentem humoris crudi & dulcis, qui si fuerit in ventriculo, aut venis mesaraicis, aut magnis vasis facile edomatur, & in sanguinē frugi, aut saltem pituitosum conuertitur.

Purgantibus humorem sensim & pedetentim apparatus signis coctionis apparentibus, vt scrupulis quatuor agarici trochiscati cum aqua vitæ drachma vna, cina-

IIII.

momī optimi scrupulo vno in vino infu-
sis, cuius expressiōi addentur diaphœni-
ci drachmæ duæ, syrupi capillorum Ve-
neris drachmæ sex, fiet potio. Ad eundem
scopum turbith. optimi drachma vna, ci-
namomi optimi scrupulus vnus permis-
centur cum vino, & ægro non parum fœli-
ci successu exhibentur. Arabes autem mi-
rificè commendant agaricum & turpe-
rum. Præterea folliculi sennæ siue infusi,
siue decocti cum aniso, & cariophilis, &
therebintina cum puluere hieræ Galeni
permista supra modum conferunt. Quo-
circa cū febres omnes intermittentes
in prima corporis regione focū obtineant,
harum sentina protinus exhausta est,
triplici remediorum genere, nempe phar-
maco, vomitum elicientibus, & clysteri-
bus. Etenim hæc præcipua remedia vniuer-
sam putredinis illuuiem febrium intermit-
tentium sobolem funditus & radicitus
extirpant, modò humores rite sint appa-
rati. Interim cautio adhibenda erit, vt mo-
tus humorum studiosè obseruetur, qui si
sursum irrepit post legitimū præpara-
tionis negotium oximelite comparatum,
vomitū proliciētib. iuuabitur. Pharmacū
verò & clysteres præcipuam putredinis
seaturiginem febris effectricè per aluum
edus

educunt. Igitur eò vsq; apparantia & purgãtia medicamẽta instituẽda veniũt, quoad tota mali radix penitus euellatur. Sunt enim curatu difficiles omnes affectus, cũ hæc methodus siue in victus ratioẽ, siue in pharmacia ad amussim non obseruatur.

Vacuantib. potius ex opinione Arabum v. quàm Græc. Arabes enim contendũt cũ vrinæ rubrę se pdunt, & cũ metus est continuę, venã pertundendã esse. Mesues precipit die pari sanguinẽ potius demendum esse. At Auicen. opinatur dextrã estate, sinistrã hyeme elidendã esse, sanguinemq; parca manu euacuandũ. Etenim verũ & certũ est Arabũ decretũ in febribus intermittentibus, cũ metuunt cruditatẽ futurã in febribus pituitosis, & in biliosis efferuescentiam. Nam vberior sanguinis missio in febre quotidiana intermittẽte cruditatẽ cõtumaciore: in febre biliosa efferuescentiã futuræ continuæ autorẽ vt plurimũ inuere solet. Hoc nomine Galenus à sanguinis missione in epiala abstinendum esse censet. Cacochemiæ enim, quæ primam corporis regionem obsidet, purgatio potius, q̃ vacuatio magis congruere videtur. Siquidem hæc ad primã corporis regionẽ vix pertingit, in locumque sanguinis puri vacuati humoris peccantis colluies

nō sine magna ægri offensione traducitur. Galenus tamen in libris methodi tradit hanc præsentissimum omnium febrium putridarum esse remedium, quod continuis febribus potius, quàm intermittentibus conuenit. Nam ea, quæ à Galeno in febribus intermittentibus instituitur, non ratione febrium ipsarum, sed plethoræ, & metu futurarum, continuarum, sæuiorumq; symptomatum decernitur. Si sanguis mutatur arcendus erit æger statim à somno, non ob subitum, vt placuit Auicennæ, sanguinis ad interna refluxum, vasorumque confractionem, sed potius ob præcipitem agitationem, permutationem sanguinis, quæ ægro non mediocre negotium facere potis est.

- VI. Vrinæ & sudores cientibus pro humoris copia, vel crassitie clementioribus, vel validioribus, quæ quidem ante signa concoctionis parū tuta esse solent. Mouebuntur autem sudores & urinæ iusculis petroselini, asparagi, hyssopi, thymi & cinamomi, syrupis capillorum Veneris, & hydromelite, in quo decoquentur radices petroselini, polipodij quercini, acori & apij p-
bè cum cinamomo aromatizando. Mel autem est huic febri peculiare subsidium ab Arabibus usurpatum. Ad hæc vinum & a-
cerum

cetum scylliticū ad humores crassos præparandos, extenuandos, per aluum & vrinas euocandos, eximie celebrantur.

Roborantibus validioribus, vel clementioribus pro maiori vel minori intemperie accōmodandis. Sunt aut in hac febre ventriculus, & hepar duæ partes affectæ, quæ sumptis & admotis præsijs pristinae sanitati restituentur. Sumpta censentur peculiaria remedia, electarium aromaticum rosatum cum puluere galangæ permistum, cortex citri condita, conserua betonica, dianisum, diacuminum, vinū absinthites, theriaca, & mithridatiū. Linimentum ad mouendū regioni ventriculi cōparabitur ex oleo nardino, absynthino cum puluere nucis moschatae, cardamomi, galangæ & macis compositum.

Symptomata emendantibus, inter quæ primum sese offert frigus febribus quotidianis peculiare, quod demulcetur in principio accessionis illitu olei irini, camamelii, & vini cretici addendo assam aromaticā & mirram. Cum verò somni immoderati importunitas obrepit, excitandus erit æger odorem niggellæ romanæ, caryophyllorum & nucis moscatae. Imbecillitas & dolor ventriculi oblitterabuntur accommodata victus ratione: dolorem lenientis

bus, materiam peccantem purgantibus, & intemperiem delentibus. Apperentia immoderata si contrahatur in conualescentibus à penuria & partium attrahentium robore, cibus euchimus concoctu facilis parca manu et frequenter exhibebitur. Si intemperies frigida, aut humor pituitosus acidus huius mali causam dederit, abigetur calida victus ratione, subsidijs pituitosum humorem præparantibus, & vacuantibus, & reliquias resoluētibus, vt vino generoso, aut hydromelite multum aromatizato, in quo ebulierint pulegium, thymus, & hyssopus. Quæ apperentiam prosternunt ob ventriculi infirmitatem alijs affectibus succedentem, sunt prorsus repudianda. Singultus materiam mali fomitem purgantibus, reliquias digerentibus, & intemperiem corrigentibus vtiliter et cōmodè profligetur. Epiala porrò est ex harum febrium colonia quam prælidia supra commemorata, sed magis incidentia, et attenuantia strenue demoliuntur:

De Curatione febris tertianæ intermittētis.

CAPVT X.

FEbris tertiana septem remediorum generibus adimitur.

VICTUS

Viſtus ratione, quæ in exquisita tertia-
 na tenuior magis refrigerans, & hume-
 ctans, in notha plenior non ita refrigerans
 & humectans, ſed aliqua ex parte abſter-
 gens & attenuans ſit. Vnde Galenus cōtra
 opinionem Alexandri Trailliani ad legiti-
 mam tertianę nothæ curationē aliquid pi-
 peris & organi vtiliter & cōmodè permiſ-
 cet cum ptiſana. Piper enim & organum,
 ſi parca manu cum alimentis commiſcean-
 tur, in temperamentis minimè calidis &
 ſiccis incommodum adferre nequeunt.
 Arabes contendunt in tertiana notha à bi-
 le vitellina contracta, alimenta calida, &
 quæ facilè putreſcunt parū tuta eſſe. Quod
 autem Galenus in tertiana vitellos ouorū
 inſtituit, qui facilè vitium faciunt & cor-
 rumpuntur. Porrigit equidē febricitantibus,
 qui alimento euchimo & concōctu facili
 indigent, & quibus humorum impuritas
 in ventriculo neſtiguam luxuriat. Quocir-
 cā in exquisita tertiana viſtus refrigerans
 & humectans decernendus eſt, vt ſunt hor-
 deata, iuſcula borraginis, oxalidis, lactucæ
 & endiuia, ſimul perfuſo ſucco limonum
 & arantij, quæ ex pullis & carnibus vituli-
 nis comparabuntur. In tertiana notha vi-
 ſtus paulò plenior & magis attenuans præ-
 ſcribendus eſt, nonnihilque cum herbis ſit

pra commemoratis petroselini & asparagi simul commiscebitur. Græci & Arabes in exquisitæ tertianæ principio tenuem victum, in augmento tenuiorem, in statu tenuissimum: in declinatione pleniorē exhibent. Tamen Galenus in tertiana notha alternis diebus cibum instituit, vt natura alimento minimē præpedita in humoris cōcoctionem fœlicius incūbat. Quamobrem legitima victus qualitas pro natura & conditione humoris peccantis, limitatior quantitas pro affectus diuturnitate, & virium firmitudine, & infirmitate: vtendi modus & occasio pro accessionum inducijs studiose obseruabuntur. Medici autem consiliū eò dirigi debet vt quatuor aut quinque horis ante accessionem alimentum præbeat, quo natura satis vacui tēporis concoctionis gratia ante accessionis insidias nanciscatur. Præterea in principio accessionum à somno ægri excitandi, in incremento meatus frictionibus aperiendi: in vigore potionibus ptisanæ & syruporum accōmodatorum, sudores mo- uendi, & in declinatione eliciendi veniūt. In tertiana autem exquisita ptisana: in notha aqua cinamomi & sacchari, aut hydromeli aquosum magna cautione exhibebuntur. Vsurpanda etiam veniunt elixa potius

tius quàm assa. Quinetiam astringentia, vt
pyra cane peius & angue sunt vitanda.

Minuentibus humorem biliosum natu-
ra tenuem & ad excretionem minimè cō-
tumacem medicamentis clementioribus,
nempe cassia, manna, myrobalanis, thama-
rindis, rheobarako, & alijs eiusmodi, quę
in tertiana exquisita mirè congruunt. Ad
hunc & eundem scopum iniiciuntur cly-
steres accommodati, qui sæpè repetiti ad
humoris peccantis euacuationem non pa-
rùm commendantur.

Vacuantibus, non ratione febris, sed ple-
thoræ potius in tertiana exquisita, quàm
vacuationem dedita opera prætermisisse
ad Glauconem videtur Galenus: quia post
tertiam accessionem alibi venam pertun-
dit, quod tempus ob vigorem morbi (in quo
authore Hippocrate, nihil tentandum est)
suspectum est. Arabes verò in hac sanguinis
missionem decernunt, vbi plethora, & vri-
næ rubræ apparent. At in tertiana notha
Græci & Arabes venam pertundunt: hiq;
venam dextram æstate, sinistram hyeme e-
lidunt. Alij verò partis affectæ, quàm cœli
maiorē rationem habent. Interim vacu-
atio administrabitur, cum exuperans cru-
ditas in primis venis minimè reconditur.
Quod hoc sæculo medici Thessalonicae in

Græcia perperam obseruare videntur. Amatus enim Lusitanus scribit Thessalonice febres tertianas ob aëris iniuriam & inclementiam mortiferas esse. Verum in historia & curatione huius febris tradit ob crassam & sordidam victus rationem corpora multis & crassis humoribus scatere, qui eiusdem testimonio ob frequentē & vberiore sanguinis missionē in magna vasa traijciuntur, febreq; funestas ingenerant, & in discrimen vitæ conijciunt.

ps 64r
IIII.

Humorem apparantibus biliosum in exquisita tertiana, aut iusculis oxalidis, endiuia, borraginis, & buglossi, aut syrupis è cichorio simplici, ex endiuia, & acetoso simplici cum aquis stillatitijs cichorij, oxalidis, & endiuia simul perfusis. Hi equidē syrupi industria Arabū excogitati sunt, magis accommodati & peculiare, quàm oximel Græcorum. Nam in sincera bile omnia præsidia, quæ mel recipiunt, sunt parū tuta. In tertiana verò notha syrupi capillorū Veneris, & oximel simplex cū aquis agrimonie, asparagi, & cassuthæ permista rite præscribuntur. Nō solū in sumendis: sed etiā in admoūendis præparandi erūt humores sacculis, regioni hepatis & venarū mesaraicarū admoūendis qui supra sunt explicati. Arabes aut cataplasmata & vntiones

Ationes in tertiana notha ad eundem scopum commendarunt.

Purgantib. humorē biliosum in exquisi- v2
ta tertiana, cum ad sui excretionē inuitat
materia apparentib. signis concoctionis,
nempe rheobarbaro, cassia, thamarindis,
manna, & myrobalanis, & syrupo ex infu-
sione rosarū. In tertiana notha nonnihil a-
garici, & senne, aut diaphœnici simul per-
misceri poterit. Cū aut ob humorū perfu-
sionē nulla ferē sit exquisita, ad sensum ve-
rō si res referatur, aliquis censeatur humor
simul cū pituita exuperante, aliquod pecu-
liare pharmacū permiscebitur. Præterea si
sursum irrepat humor biliosus, præsertim
in gracilib. & ad vomendū facilibus per su-
perna, id est, vomitum ciente fœliciter &
commode expurgabitur. Arabes in princi-
pio & declinatione accessions ob humo-
rum agitationē vomitū decernebant. Inte-
rim in purgando habenda erit ratio humo-
ris biliosi, q ob incendiū in atrā bilē vt plu-
rimū degenerat, febremq; quartanā parit.
Quæ cū ita sint, præcipuū curationis nego-
tiū eò spectabit, vt p humoris peccātis na-
tura, medicamēti qualitas, peiusdē natura
& quantitate, tēperamenti occasione, &
cœli constitutione, quantitas, haud aliter,
quàm pro humoris motu vtendi modus,

& pro varijs accessionum inducijs, opportuna occasio studiosè ac prudenter instituantur.

VI.

*Sudores
veneris.*

Sudores & vrinas mouentibus in declinatione morbi & accessionum, præsertim post signa concoctionis, vt syrupo acetoso simplici, & capillorum Veneris cum decocto asparagi, graminis, aut mulsione quatuor leminum frigidorum maiorum. Greci & Arabes non solum pharmaco, vomitum elicientibus, & clysteribus, sed etiam vrinas & sudores mouentibus, vtpote diureticis & balneo demolliuntur febrem tertianam.

VII.

*alterantibus
428
206.*

Alterantibus & roborantibus, ne ob vestigia empyreumatis relicta, & ob virium infirmitatem recidiva febris priore deterior emergat. Alterant autem & roborant diamargaritum frigidum, electarium riuu fantalorum, conseruæ rosarum & buglossi, & ea quæ admoventur, veluti epithemata, & sacculi hepatis calidiori imponenda.

VIII.

*Symptomata
emendatibus.*

Symptomata emendatibus vt sitim, linguæ asperitatem, dolorem capitis, vigiliæ importunitatem, deiectam appetentiam, & alia id genus, quorum curatio iam tradita est. Sitim verò statim arcet, decoctum hordei, iuiubarum, sebestem, glycyrrhizæ, seminis cucurbitæ & lactucæ. Scabritiem

verò

verò linguæ delent alumen & saccharum
rosatum, cum aqua rosarum mistum.

De Curatione febris Quartanæ.

CAPVT XI.

FEbris quartana nouem præsidiorū generibus expugnatur, quæ ægrè oppugnatur lethifero, vt ait Poëta, Autumno cedente pruinis, & cum deformis hyems stridere cœpit.

Victus ratione, quæ pro maiori vel minori humoris melancholici, aut atræ bilis intemperie & crassitie peculiariter instituitur. Etenim cum febris quartana ab humore melancholico frigido & sicco contrahitur, victus rationē minus calfacientē & magis humectantem postulat. Nam legitima & cōmoda victus ratio ab humore crasso & sicco tanquam præcipua indicatione sumēda venit. Igitur victus ratio magis humectans, & ob crassitiē non parum extenuans, & ob frigiditatem minus exuperantem mediocriter calfaciens instituenda est, vt humor præter naturā contraria victus ratione minori negotio edometur. Qua occasione ductus Aristoteles tradit problemate 58. victum calfacientem in febre quartana ob caloris augmentum exhi-

bendum esse. Cùm verò causas trahit à bile
retorrida & præassata, alimentis refrige-
rantibus & humectantibus ad ardorem
compescendum alendi sunt ægri. Vnde A-
uicennas refrigerantem & humectantem
victus rationē in hac febre quartana præ-
scribit, quæ indicationibus temperamen-
ti, humoris impensè calidi & sicci, & cæli
æstuantis responderet. Nec huius sententiæ
videtur reclamare Galenus, cùm in febre
quartana ab humore frigido & sicco geni-
ta, synapi & salsamenta decernit: quando-
quidem hæc parca manu, & per interualla
ad humores crassos extenuandos, & ad
robur, non ad peculiarem victus ratio-
nem instituit. Non autem Galenus contra
opinionem Alexandri Tralliani fuit vsque
adeò sui immemor, vt desiccantia humori
melancholico natura sicco, siue alimenta,
siue medicamenta pørrigeret. Vbi verò fe-
bris quartana primordia accepit à sangui-
ne adusto, minùs retorrido, alimenta leni-
ter calfacientia & humectantia meritò sunt
offerenda. Itaque pro varijs humoris me-
lancholici & atræ bilis differentijs, quæ
febrem quartanam pepererunt, diuersa vi-
ctus ratio instituetur, habita etiam ratione
humoris magis vel minùs crassi. Siquidem
in principio febris ab extenuantibus &
inci-

incidentibus alimentis arcendi sunt ægri, ne ob humorem multum & crassum maior obstructio cōsequatur, duplexque aut triplex quartana ob eiusdem portionem in aliam partem traiectam ingeneretur.

Quocirca æqua animi lance alimenta erunt perpendenda, quæ si nimium frigida, crassa & flatuosa extiterint, humorem melancholicum increassant, & altius impingunt, hæud aliter quàm nimis calida extorrent. Etenim cibi erunt concoctu faciles, mediocriter calidi & humidī, cuiusmodi sunt carnes hœdinæ, vitulinæ, volatiliū elixæ potius quàm asæ, & pisces saxatiles à Galeno non improbari. Arabes vinum album ad vrinās mouendas, & rubrum ad robur. Galenus album tenue, & olygophorum ad humores crassos incidendos, & vrinās ciendas præbent, quod diebus intermissionis tutius quàm alijs propinari poterit. Nā die accessionis aqua cinamomi & sacchari, aut mulsa commodius præscribenda veniet. Interim in principio & incremento febris ob diuturnitatē morbi plenus potius quàm tenuis: in vigore tenuis potius quàm plenus victus exhibendus est, ne natura à concoquendorum & excernendorum humorum negotio tunc perpes

ram auocetur. Quod ad occasionem alimēti porrigendi attinet: in febre quartana ab humore melancholico & sanguine adusto procreata, quinque aut sex horis ante accessionem alimenta erunt conferenda, ut natura peracta concoctione aduersus febris insultum sit vegetior. Verumtamen Arabes censent die paroxysmi ob imbecillitatem ventriculi à cibo abstinendum esse. Si verò à bile retorrida seminarium trahat, ob humoris acrimoniam alimentum non denegabitur, sed maturius exhibebitur. Semper verò instituetur victus ratio, aut iure ex perspicientia virium, aut loco & inducijs accessionum.

11. Minuentibus humorem fœculentum & excrementitium clementioribus, & levis armaturæ præsidij, ut cassia, folijs sennæ, epithymo, catholico & pilulis è fumaria, catapotijs ex hiera. Cassia enim aut catholicum quinque aut sex drachmarum pondere in bolo, aut foliorum sennæ drachmæ duæ infusæ & decoctæ, cum cinamomo & caryophilis in iusculo pulli commodè sumuntur. Quod verò Galenus prodidit circa principium ante concoctionis signa medicamentis parcendum esse, ne contumacior consequatur obstructio, & ex simplici quartana duplex vel triplex emergat: Cū
equi-

equidem tria statuuntur concoctionis signa, nempe obscura, manifesta, & perfecta, in principio obscuris concoctionis signis se prodentibus natura medicamenta, quibus olim carebant Græci, non importunè propinanda erunt. Quocirca Gelenus validis medicamentis ante signa cōcoctionis manifesta non vtendum esse vere ac sapiēter præcipit. Celsus tamen censet post septimum diem repurgandum esse corpus medicamētis, quæ si mitiora sint, commodum potius, quàm detrimentum aliquod asserre possunt, præsertim vbi lienis affecti, aut paralytis suspicio imminet. Ad eundē scopum vsurpari poterunt clysteres accommodati, quorum ope humores molliendi, præparandi, & sensim euacuandī erunt.

Vacuantibus pridie accessionis ex basilica brachij sinistri, præsertim vbi aliqua solita hæmorrhoidum, aut mensium profusio suppressa, aut sanguis melancholicus luxuriat. Si equidem sanguis niger & crassus, audacius excernendus: si tenuis & syncerus, statim suppressendus erit. Aëtius elidit venam basilicam brachij dextri, vbi affectus hepar obsidet, quem perspicue detegunt dolor, & tumor eiusdem hypochondrij, & vrinæ ruffæ. III.

Apparantibus humorē melancholicū, IV.

aut atram bilem peculiaribus medicamen-
tis: quandoquidem cum atra bilis præas-
ta huius mali causam dederit, medicamen-
tis quæ feruorem lenient, & absque mani-
festo calore crassum humorem extenuant,
edomanda veniet. Cū verò humor melan-
cholicus frigidus & siccus hanc protulerit,
incidentia & extenuantia medicamēta ca-
loris manifesti socia impune exhibebūtur,
vt puluis hieræ, sarsæ parillæ, thamaricis,
agallochi cum therebintina mistus. Quā-
obrem ad frenandam atram bilem vsurpa-
buntur iuscula botraginis, buglossi, viola-
rum, & melissæ, & syrupi è sumaria, & è
pomis, cum aquis stillatitijs scolopendrij,
lupuli & cassuthæ. Ad humorem verò me-
lancholicum præparandum accommoda-
buntur lupulus, asplenium, cassutha, sco-
lopendrium, polypodium, capparis, syrup-
us ex epithymo et oximel simplex, præ-
cipuè in quintana, sextana et nonana,
quæ remedijs magis incidentibus et atte-
nuantibus quàm alijs febres indigent. Præ-
terea vbi quartana non exquisita obrepit,
alterius humoris cum humore melancholi-
co perfusi ratio habenda erit, vt eadē ope-
ra simul medica portione ducatur. Nō solū
sumptis, sed etiā ad motis consilio Galeni
procuranda est præparatio emollientibus
unctio.

unctionibus & cataplasmatibus utrique hypochondrio admoventis. Sacculi enim in lib. de compositione medicament. descripti commodè imponentur.

Purgantibus humorem melancholicum, aut atram bilem, ubi manifesta concoctionis suffragia se promunt, vel per epicrasim syrupis & apozematibus superiori libro descriptis, aut validiori medicamento. Si quidem, autore Hippocrate melancholici infra vehementius sunt purgandi. Ad hoc porro legitimū negotiū vsurpabuntur pilule Indę è lapide cyaneo, è lapide lazuli, è fumaria cū puluere hierę diacolocyntidos & azari ut plurimū singulorū scrupulo dimidio: confectio hamech, therebintina cū puluere hierę, & asari, & catholicū, & agaricus trochiscatus cū aqua vitę. Portio commodè parari poterit ex catholici dracmis tribus, vel semuncia: confectio hamech sesquidrachma vel drachmis duabus, confectio alkermes scrupulo dimidio, syrupi è scolopēdrio 3. 6. & ex decocto buglossi, cassuthę, chamędrit, corticū capparorū thamariscis, seminum anisi, florum genistę & persicorū, addendo folliculorū senę, & epithymi, singulorū 3. 2. Pręterea ad eundem scopum accommodabuntur, ubi signa cōcoctionis fauēt, clysteres purgates

ex fenna & hiera, diacolocyntidos, & alijs eiusmodi pharmacis superiore libro explicatis. Omnes porro medici contendunt pridie accessions potionem porrigendā esse. At Hippocrates lib. de affect. docet ob materiam agitatam die accessions medicamentum præbendum, cui humores expeditius cedunt. Quinetiam Græci & Arabes vno & eodem consensu vomitum præscribunt. Sed inter se differre videntur, qđ illi post cœnam pridie accessions decernunt, vt portio humoris continentis & febrem infligentis simul cum æsculentis & potulentis promptius excernatur, natura-que die sequenti post sumptam theriacam cum reliquis humorum discutiendis alacrius certet. Arabes autem aliquando post cibum, aliquando in principio. & fine accessions ob agitatam materiam frequentius instituūt. Vomitum proritant asarum & agaricus, in oximelite infusa, narcissi bulbus, radix peponis, & radícula transfixa surculis albi veratri infusa in oximelite, vel hydromelite.

VI. Urinas & sudores mouentibus, vbi signa coctionis se deregūt: quando quidem belle & dextre omnia geruntur, quæ imitatione & ope naturæ tentantur. Ante manifesta equidē concoctionis indicia, si diu-
retis

tetica & sudores cientia exhiberentur, cō-
tumaciorem obstructionem inueherent,
duplicemq; aut triplicem quartanam in-
fligerent, sicque ægri salus perperam age-
retur. Vrinæ igitur, & sudores mouebun-
tur iusculis asparagi, rusci, graminis, & pe-
trofelini, aut syrupis capillorum Veneris,
hydromelite diuretico & vinis factitijs. Ga-
lenus & Mesues probant frictiones, & nō
improbant balneum, quod est parum tutū
splenicis, stomachicis, & hepaticis, & alijs
minimè insalubre. Huius loco Laconicum
tutius & commodius substitui poterit.

Reliquias præcipuè bustum humorum
discutientibus, siue adhibendo medica-
menta peculiaria & localia, siue vrinæ &
sudores mouentibus, vbi coctionis indicia
se depromunt. Græci non pauca remedia
familiaria celebrarunt, vt chamædrim, bu-
glossum, verbenacam rectam, aspleniū, suc-
cum cyrenaicum, piper, myrrhā, & theria-
cam. Dioscorides extollit pentaphillum,
hypericum, buglossum, libanotidem, trifo-
lium, succum ruthæ, helyotropij semen, &
verniculum in dipsaci capitulo inuentum
& collo suspensum. Ex his peculiarib. me-
dicamentis electarium sic comparari potē-
fit, ex theriacæ veteris, conseruæ buglossi,
libanotidis, singulorum drachmis duabus

VII

H

assæ aromaticæ, confectionis alkerimes, radicis pētaphili singulorum ʒ. i. & dimidia, florum genistæ, hyperici, foliorum ruthæ, radicis gentianæ, singulorum ʒ. i. styracis, calamitidis, cinamomi, lacce, seu caucami singulorum drachma dimidia, myrrhæ, castorei, singulorum scrupulo vno, croci, piperis singulorum scrupulo dimidio, Zibethi, ambræ, moschi, singulorū granis quatuor, cum syrupo è pomis, vel ex epithymo, vel scolopendrio fiat electarium, de quo sumatur pondus scrupulorum duorū, vel drachmæ vnius cum pane azimo, superbibendo vinum creticum, vel hydro-mel diureticum, vel vinum chamædris, fraxini, cæterach, & scolopendrij, vel liquorem vini stillatitij.

- xi.** Roborâtibus sumptis, vt diamosco dulci vel amaro, electario de gémis, confectione alkerimes, cortice citri conditi, vino absynthite, seu alio peculiari fastitio, conseruis borraginis, buglossi, theriaca, & aqua theriacali & admotis, utpote si ventriculus elâguescat oleo è nuce moschata eiusdem regioni imposita, si lien afficiatur, oleis è genista, & capparibus, & alijs peculiaribus remedijs ritè & tempestiuè accommodandis, integræ & pristinæ sanitati restitui poterunt.

Sym pro-

Symptomata delentib. utpote horrore, ^{ix}
immoderatā appetentiā, lienis obstructio-
nem, scirrū, hydropem & paralyſim. Pri-
mū moleſta horroris occuſatio demulce-
bitur linimēto ex aqua vitæ, oleo irino, &
anethino cōparato, & laterib. calidis pedi-
bus admotis. Gal. præſcribit aliquot grana
piperis cū hydromelite. Celsus præſcribit
decoctum abſynthij, ſalvię, origani ventri-
culo & hypochōdrijs admouendū. Cū
verò appetentia immoderata ab humore
melancholico ꝑficiſcitur, peculiari victus
ratione humorē melancholicū præparan-
tibus, purgantib. eiufdē reliquias diſſoluē-
tibus, & partes intemperie mali fomité al-
terantib. ordine & ſenſim proſtigabitur. Si
lien obſtuctione infeſtatur, tenuante vi-
ctus ratione humorē excrementitiū minu-
entibus, apparantib. apparatū purgantib.
& poſtremo roborantib. radicitus extirpa-
bitur. Quinetiā febr. quartanis ſcyrhus
ut plurimū ſuccedit, quē demolliuntur, ac-
cōmodata victus ratio humorē minuētia
apparantia, purgantia ſupradicta, & admo-
ta emolliētia, & diſcutiētia, quæ ſuo loco
poſtea tradentur. Interim axiomata medicū
ſtudioſe eſt obſeruādū, ut à leuiorib. auſpi-
cemur, & ad valentiora ſenſim progredia-
mur. Scyrro lienis ſæpenumero ſuccediē

hydrops, qui vel excitatur à flatibus alicuius humoris societate permistis. Vnde tympanites suboritur, qui scirrhus sublato victus ratione tenui, & flatus discutiente aquas ducentibus, hepatis, & ventriculi intemperiem alterantibus, & easdem partes roborantibus abigitur. Ascites peculiari victus ratione humorem serosum purgantibus, urinas & sudores mouentibus, per insensilem transpiratum attrahentibus, & hepar roborantibus expugnabitur. Leuco-phlegmatia victus ratione calfaciente, & siccante, humorem excrementitium præparantibus & purgantibus, urinas & sudores mouentibus, laconico & alijs præsidij hepatis dispositionem frigidam alterantibus, & roborantibus, peculiaribus et localibus remedijs propulsabitur. Præterea paralyfis, vt plurimum in febribus quartanis obrepit, quæ calfaciente, & extenuante victus ratione humorem mali causam effectricem incidentibus, tenuantibus, tergentibus, purgantibus, digerentibus, & roborantibus obliterabitur. Græci in hoc affectu parcius: Arabes vberius, habita ratione cœli Arabici sanguinem mittunt. Interim si affectus remedijs non cedat, sudores ope gaiaci, et sarsæ parillæ mouentia, balnea sulphurea, et causticum admodum potestrem.

stremo loco instituenda erunt. His ita stabilitis ad febres implicitas eiusdem, vel diuersi generis progrediendum est.

De Curatione febrium implicitarum eiusdem generis. Cap. XII.

Febbris implicita eiusdem generis in affectuum consentientium classe recensenda, veluti duplex tertiana, quotidiana et quartana ex copioso humore in varijs sedibus putrescente genita, quæ curatu faciliior quàm febris diuersi generis, vt continua, et mista intermittens. Verumtamen cum eadem indicationes à morbo et causa, vt in simplici intermittente, sic summatim et obiter excutienda venit, septemq; remediorum præsidijs trucidatur.

Victus ratione peculiari ob vnumquemque humorem exuperantem, febrem infligentem, affectus diurnitatē, & vires ægrantis. Etenim cū duplex tertiana ex humore bilioso circa hepar & venas meseraicas: quartana ex humore melancholico circa lienem, & mesareum vitium faciente, & quotidiana duplex circa venas meseraicas & ventriculum luxuriante, & putrescente, & in varias sedes sic deuoluto ingeneretur legitimam & tempestiuam victus rationē

postulat. Mesareum autem est publicum
omniū humorum receptaculum, pro quo-
rum qualitate & quantitate variæ febres
emergūt, quæ, vt tradit Alexander Aphro-
disæus, ob redundantem humorū colluui-
em in venis mesaraicis congestā continua-
rum typum retinent. Igitur duplex tertiana
minus refrigerante & humectante, &
propter crassitiem magis incidente victus
ratione, quàm causus & febris, peracuta
indiget. Siquidē humor biliosus copia &
crassitie magis abundare videtur, quā in
simplici tertiana & minus laceffere, quàm
in continua. Vnde pleniori victu, quàm
in tertiana simplici, & continua, sed mi-
nus refrigerante, & magis incidēte, opus
est: duplex quartana ob humorem, quan-
titate & crassitie peccantē victus ratio in-
cidens, & extenuans, & plena ob virium
infirmiorem, & affectus diuturnitatem v-
plurimū decernetur. Interim seuerior ad-
hibenda erit cautio, quàm in simplicibus
febris; quòd illæ vt plurimū in febrem
continuum degenerant, breuiioresque ad
tempestiuas viuendi leges induciæ dan-
tur. In intermissionibus enim febrium au-
thore Hippoc. cibus exhibendus est. Por-
ro in restaurāte victu partes imbecillæ ci-
bis euchimis roborādæ, dispositio relictā
emen-

emendanda, & reliquiae humorum repurgandae erunt.

Minuentibus simul non seorsum humorem excrementitium, qui sedes non admodum dissitas obsidet. Etenim unum & idem medicamentum eodem itinere & negotio humorem mali sobolem ducit. Quippe agens prius in propinquum, quam in remotum vires suas exerit. Quocirca cum humores in prima corporis regione, copia & crassitie sedes non admodum seiunctas obtinent, simul non seorsum excernendi erunt. Si autem bilis exuperat, cholagogis: si humor melancholicus, melanagogis: si pituita phlegmagogis peculiari medicamento ducetur, ut tutior vacuatio & optatior praeparatio consequantur. Si quartana a pituita crassa, ut opinatur Aristoteles, causas trahit, ad epialam referenda venit, legitimaque portione humor minuendus est. Medicus autem sedulo spectare debet speciem & indiuiduum.

Vacuantibus, id est, sanguinis missione post cruditatis fermentum in primis venis vberiori fenore luxurians sublatum, ne duplex tertiana, aut quartana, aut quotidiana, in continuam degeneret, aut diuturnior euadat, aut saeuissima symptomata secum adferat. Quamuis enim testimonio

Hippocratis, febres tertio quoque die affligentes, sunt periculosiores, quæ intermittunt, abesse periculū significant. Tamen, quia aut in continuas facile mutantur, aut diuturniores & ancipites euadunt, sedula opera sunt curandæ. Nam vitio lienis cancroſi quartanæ funestæ ſuccedunt, aut experimento Auicennæ in duodecimum annum protrahuntur; quod in multis hoc ſeculo obſeruatū eſt. Mecænas, vt teſtis eſt Plinius, toto fere vitæ decurſu febre laborauit. Quamobrem indicationes qualitatis, & quantitatis ſanguinis, mutuabuntur ex capitibus ſupra commemoratis. Si quartana duplex, aut triplex obrepit, baſilica ſiniſtra: ſi tertiana duplex ſollicitat, baſilica dextra, in acceſſionū inducijs ſanguis mitteretur. Quādoquidem, teſte Celſo, ſanguinem mittere in acceſſione hominē iugulare eſt. Preterea non ſine ſuperſtitioſa cautione poſt inædiam ſanguis mittendus eſt.

- IV. Præparantibus humorem excrementitiū ſiue bilioſum, ſiue pituitoſum, ſiue melancholicum, præſidijs ſumptis & admotis, quæ ob copiam & craſſitiem humoris peccantis rite inſtituuntur. Cum autē humor mult⁹, aut craſſus, aut ſimul multus & craſſus obſtructionē, obſtructio putredinē,
putre-

putredo febrem inuehat, statim post vacu-
ationem humores multi & crassi apparādi
erunt, vt obstructione sublata putredo &
febris protinus euanescent. Medicus autē
debet studiose perpendere morbificę cau-
sæ præteritæ expulsionē, præsentis abla-
tionem, & futuræ præuisionem.

Humorem præparatū purgantib. pecu-
liaribus remedijs, quæ humorē peccātem
clysterib. vomitū cientibus, & potionibus
extirpabunt. Interim, autoritate Hippo-
quò natura vergit, eò ducere oportet. Om-
ni equidē ope enitendū est, vt dextrè adhi-
beantur subsidia, quorū beneficio vna ter-
tiana, vel quartana altera prior pfligetur,
ne æger in febrem cōtinuam periculosam
præcipitetur. Cū .n. medicina (teste Hip-
pocr. in libr. de arte) sit morbos tollere, &
impetus obtundere, & à morbo victos nō
curare, medici sunt partes tutò & citò du-
plicem tertianam, vel quartanā, vel quo-
tidianam propulsare, & impetus obrūde-
re, à morboq; victos non curare, qualis est,
vt docet idem Hipp. quintana, quæ tabi-
dis contingit.

Vrinas & sudores mouentia, roborantia
& symptomata emēdantia ex superiorib. v i. &
capitib. petēda sunt, ne eadē sæpius incul- v ii.
care superuacaneum esse videatur.

*De Curatione febrium implicitarum diuersi
generis. Cap. XIII.*

FEbres implicitę affectus dissentientes, vt pote hemitritei ex cōtinua & intermittente compositi, hectica & humoralis, essentialis & symptomatice sunt curatu difficiliore, quàm simplices continuę, quę ab intempestiua & exuperanti aëris occurratōe, importuno et vario ciborū appulsu et molesta rerum externarum importunitate originem ducunt. Cū autem, auctore Galeno, omnes affectus, aut ab aëre aut ab his quę offeruntur, aut ab operibus exordium sumant, hi morbi inter se dissentientes ab insolita & inordinata aëris exuperantia, à varijs & caco-chymis alimentis, & laboris improbitate, præsertim hemitritei causas trahunt. Qualis equidē aër, tales spiritus, quales spiritus alimentorū beneficio, tales humores: quales humores, tales facultates & functiones emergunt. Quę omnia magis inualescunt, cū agentis robur, corporis pparatio, & diuturna mora simul conspirant, vt cernere est in autumno, qui propter aëris inconstantiam & inclementiam, corporum infirmitatem, & liberaliorē fructuum vsum, hos perniciosos affectus, præsertim hemitriteum profert.

Hanc

Hanc calamitatem sic Virgilius in Georgicis describit:

*Hic equidem morbo cæli miserranda coorta est
Tempestas totoq; autumnu incanduit æstu,
Et genus omne neci pecudum dedit, omne ferarum
Corruptiq; lacus infecit pabula tabo.*

Quâuis hi affectus sint dubij & ancipites, tamen ægri non sunt vsque adeò deperditæ sanitatis, quin adhuc curationi relinquatur locus, quæ septē remediorum capitibus continetur.

Viçtus ratione, quæ pro varia & peculiariori affectuum implicitorum dissentientium natura peculiariter, & tempestiuè instituitur. Primùm summa cautione obseruandum est in morbis anomalis & malè moratis ob variâ humoris perfusionē longiorem morbi historiam, & virium imbecillitatē, tenuiorem viçtū non esse præscribendum, vbi exquisitus hemitriteus ex æqua humorū perfusione profectus obrepit, viçtus ratio mediocris contrarietatis participes decerneretur, quæ vtriq; feбри ex æquo congruat. Vbi verò nõ exquisitus sollicitat p affectu et humore vrgētiore limitatio viuendi lex instituetur, q̃ humorem magis exuperatē, viriū robur, corporis naturā, et cælum spectabit. Interim viçtus ratio non admodum tenuis præscribenda erit,

quod, authore Auicenna, hæc febris diu-
tius protrahitur. Præterea sedulò obseruā-
dum est, ne alimentum sæuiente febris in-
termittentis accessione offeratur, potusq;
urgēte sit in principio eiusdem accessio-
nis exhibeatur. Nam febris vtraque conti-
nua et intermittens ob alimentum intem-
pestiuè ingestum nimio opere excandesce-
ret, potusque ptisanæ ad demulcendam
sitim, in principio accessionis exhibitus
ob humores exagitatos, & à putredinis fo-
co in ventriculum effusos, in centroque
corporis contentos, feritatem affectus au-
geret, nisi opportunū vigoris tempus ex-
pectaretur, quo calor ad superficiem euo-
catur, simulque cum eo humores traiciun-
tur. Si verò febris hectica et humoralis, si-
ue continua, siue intermittens ægrum si-
mul exercet, vtrique feбри victus ratione
refrigerante et humectante, et putredini
obstante, prouidenter consulendum est.
Vbi autem febris symptomatica simul cū
essentiali inuadit, urgentioris altero non
neglecto, habēda erit cura, cuius legitima
diætę instituendę methodus ex simpliciū
febrium curatione petenda venit. Porro
instaurans victus post morbi victoriā sem-
per est instituendus, qui virium et effluuij
iacturam reparabit.

Minuena

Minuentibus humorem excrementitiū, 11.
nempe bilem et pituitam æquo pondere
exuperātem, si est exquisitus hemitriteus.
Cum verò nō exquisitus sollicitat humor
magis luxurians, siue pituitosus, siue bili-
osus accommodatis præfidijs repurgabi-
tur. Interim humor peccans, qui primam
corporis regionem obsidet, ad colluuiem
minuendam optatiorem præparationem
& tutiorem vacuationem protinus exhau-
rietur, ne huius traiectio in magna vasa se-
uiores symptomata inuehat. Idem statuen-
dum erit de essentiali et symptomatica, vt
sordescens putredinis labes purgetur, pe-
riculosaq; huius symptomata eadem ope-
ra demulceantur. Si hectica et humoralis
simul immaniter affligunt, noxia humoris
peccantis portio blando pharmaco duce-
tur, quod feбри hectice minimè incommo-
dabit. Etenim fieri non potest, vt hectica
profligetur, nisi febris humoralis prius a-
dimatur.

Vacuantibus id est, sanguinis missio. 111.
ne, quæ pro magnitudine vtriusque affe-
ctus viribus, et temperamento ægrotantis
habitu corporis, ætate, cœli constitutione,
victus ratione suppressa, vel immodica e-
uacuatione, et futura actione læsa legitime
& tempestiue instituetur. Interim in hoc

studiose incumbendū est vt vrgentiori affectui, altero non neglecto occurratur, quī quidē, testimonio Galeni, vrget, vel propter affectae partis praestantiā, vel affectus magnitudinem, vel malignitatem. Prudentis lanè est medici, tāquam ex alta specula prēuidere cū quibus, & quot hostibus cerandum venit. Si autem inflāmatiō partē principem occupat, mollienda erit vacuatio, quā è regione eidem respondet, praesidiaque localia eodem negotio admouebuntur.

iiii. Præparantibus humores multos & crassos, qui ingentem obstructionem in hoc affectu pepererunt. Non solūm autem in prima, sed etiam in secunda ob febrem continuā & intermittentem delitescit obstructio, quā peculiaribus subsidijs bilē & pituitam apparantibus, in hemitriteo expedienda venit. Sumptis & admotis supra commemoratis rite profligabitur. Hoc idē accuratē præstandū erit in febre humoralī, quā febris symptomatica aut hectica comes existit.

v. Purgantibus humorē pituitosum & biliosum probè, apparatus in hemitriteo remedijs phlegmagogis, & cholagogis. In febre hectica & symptomatica cū humoralī implicata magna cautione adhibenda est
purg

purgatio, ne pro commodo, funestum incommodum consequatur. Interim ad legitimam & tempestiuam purgationē accingendum est, quæ affectum hūc adimit, sine quā alter nulla industria extrudi potest. Cū verò in hemitriteo bilis pituitam polluat, & putrefaciat, & velut continuo stimulo exagitet, feraque symptomata simul excitet, clementioribus & minus calidis medicamentis agendū erit quā in febre intermittente.

Roborantibus sumptis, ut saccharis, seu VI.
conseruis, conditis, & tabellis, & admo-
tis, utpote epithematibus & linimentis
peculiaribus, quæ iam fusiùs explicata
sunt.

Symptomata emendantibus ut sitim, vi-
giliam immoderatam, coma, dolorem, gra- VII.
uitatemque capitis, & extremarum par-
tium frigiditatem. Cū humores bilio-
si & pituitosi, falsi seu corrupti sitim pepe-
rerint, accommodatis pharmacis sunt pur-
gandi, sine quorū legitima excretionē sitis
nullo modo edomari potest. Cū verò ca-
lor & siccitas hanc inflixerint refrigeran-
tibus & humectantibus demulcebitur. Dios-
ad huius rei scopum tragacantham cum
feminibus cucumeris tritam, & cum ouo-
rum recentium albumine crudo dilutam

cataportia fingit, quæ tempore sitis sub lingua tenentur. Vigilia immoderata frontali bus et lotionibus suprâ commemoratis abigitur. Coma seu somnus profundus clysteribus paulò validioribus, frictionibus, ligaturis, postremò vesicatorijs collo ad motis, & synapismis, si prioribus remedijs non cesserit morbus, expugnabitur. Aui cennas commendat ligaturas dolorem intelligentes. Capitis grauitas purgatione, reuulsione, deriuatione, clysteribus acribus, cucurbitulis & apophlegmatismis, intemperiemque alterantibus propellitur. Aui cennas prima 4. tractatu 2. cap. 19. suffitum ex decocto chamæmeli, furfuris & rosarum commendat. Si extremarum partium frigiditas à caloris influentis penuriâ contracta sollicitet, cibus euchimis fulciendus et reficiendus erit æger. Si dolor hunc affectum progignat, humores peccâtes huius symptomatis causæ effectrices purgandi, flatus discutiendi, dolores leniendi, et partes externæ calfaciendæ, vt eadem opera, calor à centro ad superficiem reuocetur.

His ita stabilitis ad febris pestilentis
& sudoris britannici curationem
properandum est.

De

De Curatione febris pestilentis & sudoris
britannici. CAPVT XIV.

PEstis seu febris pestilens vno & eodem
Græcorū & Arabum consensu est con-
tinua, maligna, venenata, & non vulgari
putredine constans, cor præcipuè conuel-
lens, & insidiosè interimens, quæ quidem,
vt docent Galenus libr. 3. de præfagit. ex
pulsib. & Auicennas prima 4. tractat. 4. ca-
pit. 1. aut spiritus, aut humiditates, aut sub-
stantiam cordis corrumpit, à causaque oc-
cultâ, aut manifestâ originem trahit. Causa
porrò occulta ad Deum Maximum refe-
renda venit, qui hominum scelera misera
pestis calamitate vlsciscitur, vt sacra oracu-
la confirmant. 2. Reg. cap. 21. Et apud Iere-
miam cap. 14. Huic diuino decreto subscri-
pserunt Ethnici & extranei, qui Christia-
nismum ignorabant, vtpote Galenus in
proœmio libr. primo Epid. Plutarchus in
vita Romuli, & Titus Lilius libro sexto.
Causa verò manifesta dependet ab insoli-
ta & inordinata caliditatis & humidita-
tis exuperantia, & ab aëre qui inficitur, &
conspurcatur à putridis cadauerum, aqua-
rum stagnantium, mineralium, terræ in-
tuum, specuum, & vnguentorum vene-
natorum expirantibus, vè ratio atq; ex-



perientia satis atque satis fidem faciunt. Etenim Hippocrates libr. 3. Epid. Galenus libro primo de different. feb. & Auicennas 1. 4. tractat. 4. cap. decimo, contendunt à caliditate extranea, humiditate exuperanti, & austrina constitutione putrefactionem generari, & febres pestilentes excitari. Galenus & Auicennas scriptum, reliquerunt inter perniciofa inquinamenta à cadaueribus aërem contaminari, quo homines peculiari quadã sympatia promptius & citius afficiuntur, & inficiuntur. Inter hos etiam calidi & humidi poros apertos obtinentes, pueri, vtero gerentes, & intemperanter viuentes hac funesta & mortifera lue celerius corripuntur. Plinius verò prodidit lib. septimo cap. 50. senes ob siccitatem non ita facile conspurcari. Quinetiam alimenta vitata in causa manifesta recensentur, quæ in difficili annonâ corruptos & malignos humores ingenerant, effrœnatumque pestis affectum infligunt. Cæterum cum non desint plures eximij medici, qui contra sacra oracula, & magnorum authorum testimonia pestem à syderum cômistione, & cæli motu defluere censent, quorum supersticiosæ opinioni breuiter & obiter satisfaciam. Primum sacram Hieremiæ authoritatem
profe-

proferam, quæ hanc contumeliosam opinionem apertè demolitur, cum docet non esse metuenda signa, quæ timent gentes, subditque ad certam huius rei confirmationem, vanas & irritas esse earum leges. Huic diuino decreto astipulantur Basilius Magnus in Hexamerû & Genesi: & Diuus Ioannes Chrysostomus commentarijs in Matt. cum scripserunt. Nô mediocri iniuria cœlos & astra inurere eos, qui ab his aliquid vitij deriuari sibi falsò persuadent: quippe primam & puram formã à Deo impressam nunquam exuerunt. Horum certissimæ sententiæ minimè reclamant Plato in Epinomide, & Aristoteles libro nono Metaphis. qui prodiderunt astra corpora pura, simplicia, bona, non maleuola, corruptioni & mutationi minimè obnoxia, quæ nihil maligni in hanc inferiorem regionem impertire possunt. Nam astra & sydera suapte natura pura & simplici forma constantia aliam formam imperfectam obtinerent, ex qua aliquid impurum ad nos dimanaret. Nec est satis quod obijciant astra simplicia & minimè mala esse, sed vario eorum motu & congressu hanc mortiferam aëris pestilentis luem in hanc elementarem regionem dispergi. Siquidem cum astra sint pura, sint.

plicia, simplici que forma constent, nec minui, nec mutari, nec aliam formam in quouis loco & horoscopo adipisci possunt: sed calore viuifico, non elementari motu, & lumine vapores, exhalationes, & omnia meteorora pro subiecta materia excitant, simul ventos suscitant, variasque constitutiones impellunt, quarum occurratone varij morbi emergunt. Aliud equidem est ex substantia & forma, & congressu aliquid maligni demitti, aliud calore cœlesti, lumine & motu vapores tetros ex cadaueribus, aquis stagnantibus, mineralibus, & ex specubus excitare. Plato in Epinomide non solum à simplici forma corruptioni & mutationi minimè obnoxia, sed etiam à motu, & congressu fœdum aëris pestilentis virus minimè induci, cum admiratur cœli, & syderum magnificam, decentem & optimam choream, quæ nullam perniciem in hæc inferiora diffundere potest. Si Hippocr. Galenus & Auicēnas, alijque grauissimi auctores astrorum & syderum meminerunt, eo animo tantum mentionem fecerunt, ut iam latius demonstraui, quò anni tempora, solstitia, & æquinoctia describerent. Quocirca astra, & sydera, & cœli calore, lumine & motu aliquid malignum in hanc inferiorem regionem eiaculari nequeunt, cum id præstarent,

starent, aut vt qualitates, aut vt liquores,
aut vt corpora, quæ vt iam fusiùs explica-
tum est, nullo modo contingere possunt.
His ita constitutis, antequam contagiosa
causarum externarum sentina eluatur, cer-
ta curationis & præseruationis febris pe-
stilentis methodus describeretur, ad Deum
Maximum Summum huius vniuersitatis
architectum & moderatorem confugien-
dum est, qui Sacris testimonijs, vtpote lib.
2. Paralip. cap. 7. vera fide & pura mente in-
uocandus est, vtab hac pernitiōsa cōtagio-
ne se redimere possint homines. Quod ad
causam vniuersalem spectat, nempe fœdā
aëris impuritatem, primum pestis semi-
narium, magistratus præcipue sunt partes,
vt hæc venenata qualitas publicis ignibus
excutiatur, præsertim cum hæc mortifera
lues populariter grassatur. Hoc equidem
Empedocles, Acreon, Hippocrates in rem
hominum olim præstiterunt. Si à specubus
& aquis stagnantibus hæc maligna expira-
tio contrahatur, specus erunt occludendæ,
& aquæ stagnantes vel desiccandæ, aut a-
quarum alucis irrigandæ. Si hæc funesta
colluies à cadauerum strage & clade obo-
riatur, hæc humi recondenda protinus ve-
nient. Interim cum hæc immanior & fero-
cior febris pestilentis calamitas insidiatur,

magistratus etiam in hoc totus esse debet, ut homines periti eligantur, qui pro ægrorum curatione loca comoda, & ad affectû profligandum necessaria cõparabunt, medicique & chirurgi experti huic difficili negotio complendo præficiantur. Etenim si testimonio Hippocratis oportet in omnibus morbis non solû seipsum præstare oportuna facientem: sed etiam assidêres & exteriora, quantò magis in hoc funesto morbo omnia accuratius sunt accommodanda. Nunc ad curationem venio, quæ octo præsidiorum generibus perficietur.

1. Victus ratione, quæ in hoc versabitur, ut alteret, & malignitatem depellat. Primum cum, authore nostro Hippocrate in libro de flatibus aër sit vitæ & morborum author, æger cane peius & angue, aërem impurum & vitiatum vitabit, frueturque puro, lucido, & ad ventros salubres vergente, qui ignibus luculentis, aut suffutibus pro varia cœli constitutione accommodatis emendabitur. Cibum euchimi non excrementitij, sed authore Auicenna prima quarti tractatu quarto capite quarto refrigerantes, acidi, desiccantes, putredini obsistentes, & malignitatem depellentes erunt. Primum gelatinæ, collata, pressa, destillata, instaurantia, hordeæ

hordeata, panatellæ ex pane loto confectæ
& iuscula ex carnibus vitulinis, & pullorū
præparata cōparabuntur, quibus admisce-
būtur succi citri, limonū, arantiorū, scabi-
osa, pimpinella, oxalis, buglossus, & ea quæ
ad pestem profligandā faciunt. Cū autē
vires in hoc periculoso affectu elangues-
cunt, & sensim liquefcunt, cibus paucus &
frequentior est offerendus. Quamuis verò
sit deiecta appetentia ad cibum sumēdum
cogendi sunt ægri: quandoquidem testi-
monijs Arabum, qui vtiliter concedunt, ab
huius morbi pernicie vindicantur. Qui fe-
bre diaria pestilenti conflctantur, parco &
paucō alimento sunt fulciendi, ne sudorū
impetus intercipiatur. Potus erit ptisana
ex hordeo, coriandro, seminibus oxalidis,
citri, cardui benedicti, & cidoniorū parata,
addēdo paucum acetum, quod sua natura
refrigerat, & putredini reluctatur, magisq;
biliosis quā melancholicis est peculiare.
Quamobrem victus refrigerās, & maligni-
tatem depellens pro natura ægri, & cæli,
quantitas pro viribus, ætate, & aëris con-
stitutione instituetur. Præterea in hoc ob-
nixè incumbendum est, vt in principio
morbi à somno arceatur æger, qui omnino
exitialis est, quoad insidiosa veneni labes
foras extrudatur.

*Gal. Comm. in
li. de rat. vict.
in morb. acut.
cap. 17.*

Siquidem contra quorundam recentiorum opinionem somni tempore venenata qualitas intus remanet, & cordis substantiam promptius obsidet. Itaq; frictiones loco motus, & ligaturę dolorem adferentes decernendæ erunt, quæ hoc perniciosum virus intus delitescens foras euocabunt. Interim religio esse debet in porrigendis carnibus assis: Nam, authore Galeno, carnes assæ non sunt offerendæ ijs, qui acuta febre laborant.

- II. Malignitatem arcentibus & corroborantibus, quæ protinus sunt porrigenda, antequam contagiosa qualitas cordis substantiam occupet. Quippe, authore Galeno libro tertio de præsagitione expulsi-
bus, ubi venenata qualitas cordis substantiam obsidet, ægri deperditæ sanitatis euadunt. Porrò alexipharmaca seu amuleta, quæ aëris pestilentis contagia excutunt, aut sunt simplicia, aut composita, eorumque alia sunt frigida, alia calida, quæ aut intus sumuntur, aut foris admouentur. Simplicia frigida censentur, aurum, argentum, acerum, bolus armenia, coriandrum, caphura, lapis bezoar, buglossus, borrago, myrobalani, ebur, semen oxalidis, nymphaea, thamarindi, portulaca, granum tinctorium, succinum, oxis Plinij, viola, coral-
lus,

Ius, os è corde cerui, cornu vnicornis, hyacinthus, smaragdus, vniones, margaritæ, granata, fragmenta pretiosa, & terra Lemnia. Alia sunt calida, acorus, aristolochia, absynthium, amomū, agaricus, allium, ambarum, angelica, ben vtrumq; bistorta, calamintha, calandula, dictamnus, eupatoriū, maiorana, balsamita, tormētilla, moschus, scabiosa, rutha, valeriana, chamædrys, pulegium, lisimachia, hypericum, myrrhis, salvia, abrotanum, carduus benedictus, galāga, cyperus, gentiana, melissophilum, myrrha, therebintina, spica nardi, nux moschata, betonica, tapsus barbatus, ocimum, rosmarinus, marrhubium, caryophilum, cinnamomum, cybeta, lignum aloës, & cortex citri calida, cuius succus frigidus est. Alia sunt composita, cuius coloniæ existunt, conferuē buglossi, violarū, scabiosæ, nymphaeæ, rorismarini, cortex citri condita, radix eryngij condita, myrobalani conditi, zinziber & zurumbet conditum ab Arabibus celebratum, quod Zedoaria nuncupatur. Inter composita medicamenta principatum tenent antidoti, vt theriaca & mythriderium, quæ præstantia & vtilitate ceteris prælucent. Sunt & aliæ, vt antidotus Ælij Gaij, qua utebatur Cæsar, & in alia in thesauris Mithridatis reperta, quæ ex cari-

carum pinguium, & nucis singulorum nu.
2. & foliorum ruthe nu. 20. & salis scrupulo
dimidio componitur, hanc mirificè extol-
lit Nicander. Quin etiam celebratur hoc
seculo antidotus de ouo, quæ excipit o-
uum numero primo, sublato albumine,
per huius acumen croco impletum, sub
cineribus positum, & ad nigredinem deco-
ctum, in pulueremq; redactum, radicis tor-
mentillæ morsus diaboli, angelicæ, pinpi-
nellæ, dictamni, Zedoariæ singulorū drac-
mas duas, theriacæ vncias tres, misceantur
omnia cum aqua scabiosæ, & rosarum, &
fiat electarium. Præterea syrupi peculia-
res prostant apud officinas, utpote è li-
monibus, ex acido citri succo, è scabio-
sa, è melissa, è buglosso, è borragine; ex
oxalide, è pomis, acetosus simplex, & o-
xisaccharum. Liquores stillatitij ex simpli-
cibus alexipharmacis comparantur, ut li-
quores stillatitij melissæ, scabiosæ, rosa-
rum, cardui benedicti, & alij huiusmodi.

Ex his omnibus componi possunt con-
dita, electaria, tabellæ, & pulueres, ut exē-
pli gratia: Conditum extemporaneū fingi
poterit, ex conseruarū borraginis, buglosi
singulorum vncia vna, boli armenij, terræ
lemniæ, singulorum drachma vna, rasuræ
eboris, spodij singulorū scrupulis duobus,
semi-

seminum citri, ocimi, pulueris diamargariti frigidi, ligni aloës, ofsis de corde cerui singulorum scrupulo vno, sacchari rosati quantum sufficit, fiat conditum. Ad eundem scopum comparabitur electarium ex theriacæ veteris metrhidatii singulorum vncijs duabus, conseruarum buglosi, oxalidis, corticis citri conditi singulorum vncia vna, boli armenij drachmis duabus, puluere radicum, zodoariæ, dictamni, pentaphilli, tormentillæ singulorum sesquidrachma, corallorum, rasuræ eboris, cornu cerui, santalorum singulorum scrupulis duobus, pulueris diamargariti frigidi, letitiæ Galeni singulorum scrupulo vno cum syrupo conseruationis citri fiet opiata, vel parantur tabellæ ex hisdem simplicibus alexipharmacis, cum saccharo aquis melissæ, & scabiosæ dissolutis & mistis. Conditorum & tabellarum drachmæ duæ, & antidoti drachma vna & dimidia, aut scrupuli quatuor cum stillatitijs liquoribus aut syrupis supra commemoratis æstate, & cum vino hyeme exhiberi possunt. Sunt etiam quedam, quæ foris admoventur, & malignitatem contagionis pestilentis abigunt, vt sacculi expulueribus alexipharmacorum compositi, olea hyperici, & scorpionibus, & pomum odoratum. Tamen studiose obseruandum est

quod ad præcautionē cū vino, aquis stillaritijs & syrupis, cū febris vrget, syrupis aut aquis stillaritijs, non cum vino ad augendum febris incendium instituantur. Quinetiam theriaca, aut mithridatium cū liquorib. permista, et ad præcautionem, & ad curationē regioni cordis vtiliter & cōmodè admoueri possūt. Siquidē febrī hectice pestilenti alexipharmaca sumpta, & admota, diarīæ eadem & sudores & vrinas mouentia & huic quæ humiditates cordis depopulatur, omnia alia præsidia citò & tutò opitulantur. Tamen vt pestis, authore Galeno, sine febre, vel cū febre grassatur, sic febris cum peste epidemicus, & sine peste peculiaris & minus perniciosus contrahitur.

*Lib. 3. Epid.
sect. 3.*

111. Minuentibus humorem maligna qualitate, aut quantitate exuperantem nullis datis inducijs, quod hic morbus sit effrenatus, & præceps, inopinatasq; insidias præ se fert. Galenus enim lib. 10. de different. feb. docet statim corpus repurgandū esse, antequam vires labascant & corruant, & febris pestilentis virus cordis substantiā occupet. Medicamentorū porro natura pro humoris peccantis conditione, quantitas pro viriū robore corporis, humoris & cœli constitutione, vtendi modus pro humoris motu

motu ritè præscribetur, semper additis his, quæ alterant, & malignitatem propellunt. Medicamenta autem peculiaria erunt, cassia fistularis, manna, thamaryndi, myrobalani, rheum barbarum, agaricus, catapotia ruffi, è fumaria, aggregatiuè, catholicum & confectio hamech, aliaque eiusmodi cū aquis melissæ, scabiosæ, cardui benedicti, vel decocto sarsæ parillæ, cynæ, seminum cytri & cardui benedicti infusa, vel dissoluta: addendo syrupi è scabiosa, vel è limonibus, vel è pomis ʒ.s. vel drachmas 6. boli armenij scrupulum dimidiū. Hoc videtur apertè contra multorum opinionem confirmasse Galenus lib. 5. Method. cap. 12. cū scribit febre pestilenti correptos exsiccationem postulare, corpusque potionibus, aut vomitu purgandum esse. Cū autē natura humorum corruptorum portione leuatur, reliquias humorum perniciosorum expeditius edomat, tuncque pustulæ ut plurimum efflorescunt, sicque omnes salui euadunt. Auicennas huic sententiæ astipulatur prima 4. tract. & cap. eodem, cū prodidit febrem pestilentem desiccationem, phlebotomiam, & ventris solutionem ad verā huius curationem requirere. Quod verò Hippocrates docet lib. 3. Epid. quosdam alui profluuii perijisse, de alui profluuii

symptomático & colliquescente hic locus intelligendus venit, cum eodem lib. sect. 3. declarat aliquos per alui turbationem, tempestiuamque excretionem vinarum sanitati restitutos fuisse. Sed quidam obijciunt venenatam qualitatem post apparentem bubonem ad internas partes vi medicamenti elici posse. Huic incommodo facile occurrere licebit, si buboni emplastrum attrahens, ut ex ammoniaco, galbano, oppopanax, & theriaca concinnatum, & cucurbitulae admoueantur. Adde quod maligni humores ope medicamenti & robore naturae foras extruduntur, hosteque sic profligato nullum periculum expectandum est. Interim consilium Hippocratis alta mente repositum esse debet, ut quod natura vergit, eo ducentur humores. Si enim sursum irrepit humor, vomitum cientibus purgabitur: si in intestina depluatur, aluus clysteribus erit sollicitanda.

IIII. Vacuantibus sanguinem, ubi corpus est plethoricum, & vires non reclamant, ut confirmant Hipocrates lib. 4. acutorum Galenus lib. de curand. rat. per sanguinis missionem: & Auicennas prima. 4. praesertim cum ab aere corrupto originem ducit. Tamen Galenus in lib. de succor. bonit. videtur improbare sanguinis missionem, quae

que in difficili annona à cibis cacochimis, humorum corrupta, & magna virium infirmitate nascitur. Etenim cū humores non solum in cordis substantia, sed in toto corpore nimio opere exuperant, viriumque infirmitas simul consequitur, sanguinis missio parum tuta esse videtur. Quod verò nonnulli recentiores sibi persuadēt sanguinis missionem exagitare humores, & eosdem per vniuersum corpus diffundere, tantum equidē abest, vt vacuatio humores impellat, & effundat, vt à corde & genere venoso virus statim & confertim detrahať. In principio febris vena est pertundēda, antequā venenata pernicies cordis substantiam occupet, affectus ferocior euadat, & vires supra modū elanguescant. Auicen. 1. 4. tract. 4. cap. 10. in exanthematum & ethymatū curatione à sanguinis missione ante 4. diem auspiciandum esse scribit: quòd tunc tēporis effervesceat sanguis, & exanthemata nondum se in apertum dederūt. Quamuis si corpus est plethoricū in signis sit sanguinis effervescētia, exanthemataq; integrè non eruperunt, rursus parca manu necessitate urgente sanguis erit mittendus. Cæterum elidēda erit vena habita ratione partiū in quibus extuberant bubones, vt si pone aures emergant, cephalica; si sub

axilla mediana, si in inguine saphena per-
tunderetur. Cum verò pustulæ ob copiam &
efferuescentiam in cute efflorescunt, me-
diana vel basilica secabitur, vt natura san-
guinis maligni portione leuata in reliqui-
as expeditius incumbat, impuritatemque
venenatam ad cutim excutiat. Hæc tamen
sanguinis missio non videtur esse instituē-
da post exanthematum eruptionem, nisi
ob sanguinis copiam & excandescenciam
febris inuale scat. Cum venenata qualitas,
spiritus, aut solidas cordis partes obsidet,
repudianda est vacuatio.

- v. Præparantibus humorē vel pituitosum,
vel melancholicum, vel biliosum peculia-
ribus subsidijs, vt obstructione sublata p-
tinus mitescat affectus. Nam cum humorū
copia obstructionem pepererit, hæc vti in
alijs affectibus expedienda venit, quò na-
tura humores peccantes celerius excernat
aut medicamentis facilius cedant. Igitur
cum humores biliosi obstructionem inue-
hunt, syrupo è cichorio simplici, & aceto-
so simplici cum aquis buglossi, oxalidis &
eupatorii apparabuntur. Cum verò humor
melancholicus id vitij inflixerit, syrupi è
fumaria, è lupulis, è buglossio cū aquis me-
lissæ, scabiolæ, & cardui benedicti mirifice
opitulabuntur. Præterea cum retorridi &
ferui-

feruidi euadunt humores, alterantibus, & malignitatem depellentibus sunt obrundendi, vt syrupis è limonibus, violaceo, è buglossò, ex oxalide semper additis peculiaribus alexipharmacis. Vnde Arabes legitimè & oportune instituunt aquam frigidam, & refrigerantia subsidia ad extinguendum caloris incendiũ, in duobus primis diebus ante ec̃thymatò & exanthematon eruptionem. Cum verò post tres dies incipiunt efflorescere, parum tuta sunt alterantia & refrigerantia, quòd humorem peccantem in partibus internis non sine magno discrimine retinerent, eorumque ad cutim eruptionem remorarentur.

Vrinas, & sudores cientibus, cum eò fe- v r i
runtur humores, veluti in diaria pestilentia, què sudorum eruptione soluitur. In alijs verò febris pestilētis differentijs vrinas & sudores mouentia sunt contra recentiorũ quorũdam opinionem parum tuta, nisi eò vergat natura, & meatus sint aperti. Quod autem apud magnos aũthores, pori cutis aperti, & astricti probantur, & damnantur: qui quidem in aëre corrupto suspecti esse debēt: quando quidem exspiratio venenata non solum per os, sed per arterias ad cutim pertingentes in cordis arcẽ obrepunt, vt testis est Galen. lib. 1. de differ. feb. cap. 4.

K

Si verò humor malignus in corpore deliteſcat, pori cutis aperti non improbantur, qđ humores mali effectrices expeditius effluunt, ægriq̃ue citius liberantur.

VII. Exanthemata, eſthymata bubonem & carbunculum ſanantib. quæ febres peſtilentēs ſæpenumero comitantur. Primum exanthemata & eſthymata ex bile, aut ſanguine efferueſcente profeſta grallantur vt plurimū poſt conſtitutionē australem vere potius, quàm hyeme, & aliquādo autūno propter humorum malignitatē, aggrediunturq̃; frequētius calidos & humidos, pueros & adoleſcentes, rarius iuuenes, & rariffime ſenes, curanturq̃: peculiari victus ratione, alexipharmacis minuentib. vacuātibus, accelerantibus, ſanantib. & ſymptomata depellentibus. Victus ratio pro varijs exanthematū tēporibus varie inſtituetur. Nam authore Auicen. 1.4. tract.4. cap.10. in duobus primis diebus ad reſtringendam ſanguinis efferueſcentiā debet eſſe refrigerans: deinde tēperatus ſtatim eligendus, aut induſtria præparandus eſt, ne frigidior poros occludat, & exāthematon eruptionem remoretur. Alimenta porrò debent eſſe in principio refrigerantia ad caloris extinctionē, & ad robur leniter aſtringentia, & circa exanthematon eruptionem poſt
retu-

retusam efferuescentiam non ita refrigerantia, nulloque modo astringentia decernenda veniunt. Præterea victus initio tenuis est instituendus, qui tamen in pueris ob exuperantem calorem innatum, & continuam resolutionem paulò vberior & frequentior præbebitur. In materia venenata alexipharmaca sunt permiscenda, cuius generis sunt succi citri, limonum, semina oxalidis, & ocymi, mali citrij, folia buglossi, borraginis, pimpinellæ & violarum. Quinetiam alexipharmaca sumpta & admota iam commemorata statim ad malignitatem discutiendam sunt præscribenda. Cum verò corpus magna humorum impuritate sordescit, minuentia & mitia medicamenta statim sunt offerenda, antequam excandescat affectus. Id genus sunt leues clysteres, aut blanda medicamenta, veluti cassia, manna, & rheubarbarum. Valida enim medicamenta nimio perè calfacerēt, atq; immoderatū alui profluvium non sine ægri discrimine proritarent. Post minuētia pharmaca, sanguinis missio, teste Gal. lib. 6. Epid. cōment. 6. protinus tentāda est, quia natura portione sanguinis leuata reliquias expeditius edomat, à sæuioribusq; symptomatib. vindicatur. Interim quāritas p viribus ægrotātis,

*Exanthematū
& ecchymatū
curatio.*

reperamento, habitu & ætate, alijsq; coindicationib. detrahetur. Nō videtur autem reiteranda esse vacuatio, nisi exuperās sanguinis copia, & incendiū id suadeant, symptomatumq; feritas vrgeat. Cæterū his legitime & tempestiue administratis acceleranda sunt exanthemata præsijs, quæ materiam ad cutim excuriunt & maturāt, extincta prius sanguinis efferuescentia. Nam antequā effloruerūt in cute exanthemata, sanguis excandescit, qui alimentis refrigerantibus, & remedijs refrigerantib. & leniter astringentibus obtunditur, cuiusmodi sunt syrupi è granatis, è ribes, & ex acetositate cytri. Ad cutim verò euocant, quæ urinas & sudores mouent, celebranturque ab Arabibus in hoc negotio, decocta lentium excorticatarum, tragacanthæ, ficuū & lacæ. Maturant aut suffitus & foci ex malua, althea, floribus chamæmeli, meliloti, anethi & violarum, & fursutibus tritici comparati, quos Rhases in vesiculis reponit, & maturādis exanthematib. admouet. Postquam cocta fuerint, post 7. diem acut aureā, ut docet Auicē. sunt rumpenda, ne sanies diutius retēta altius serpat, & partes subiectas cauet. Desiccabuntur è vestigio post apertionem puluere aloës, myrrhæ, thuris, & terræ Lemnię. Symptomata testimonio
Auicē.

Auicennæ comitantur exanthemata, veluti prurigo, quæ poros aperiētibz & detergentibus demulcetur. Sunt etiam quædam partes, quæ conflantur, vt gula, pulmo, oculi, nares, & intestina, aluiq; profluuiū consequitur. Hæ aut sic ab exanthematōn iniuria vindicabuntur, vt gula gargarismis, decoctionis rosarum, rhois, & myrtillorum, addendo dianucon, & diamorrhō. pulmo linctu, syrupis è papauere, & rosis siccis, oculi, collyrijs, aquæ rosarū, aut decoctionis rhois, & sumach, addendo collyrium albi rhasis, & tātillū croci, nares odoramentis aceti, aures oleo rosato, pauco aceto, & glaucio, & intestina clystere ex decocto rosarū, rhois, sumach, orizæ, & oleo rosato cōposito. Sequuntur ordine bubo & carbunculus, qui simul aut seorsum erumpunt, febribusq; malignis, & pestilētibz, vt docet Auicenn. succedunt, et aliquando auctore Gal. febres prægrediuntur, aliquādo consequuntur, præsertim carbunculus, qui in regionib. calidis frequentius quā bubo grassatur. Docet aut hic lib. 6. Epid. comment. 29. febres pestilentes à symptomate nomen sortiri, et sic post carbunculū oboriri. At lib. 14. Method. apertè etiā prodidit febres pestilentes ante carbunculum excitari. Siquidem contingit, vt vires ve-

gete, & validæ humoris venenati portionem in partes externas depellant, carbunculusq; statim emergit, breuiq; tēporis vestigio pernicioſa qualitas ita inualeſcit, vt febrem pariant. Cū verò ſunt imbecillæ & effœtæ, ſtatim primo veneni inſultu febris accenditur, carbunculusq; ſe poſtea profert. Idcirco bubo ad claſſem inflammationum à Galeno relatus, & carbunculus à ſanguine craſſo & retorrido genitus, eandem victus rationem, alexipharmaca minuentia, & malignum humorem, vt in febre peſtilenti vacuãtia non diſſimilia, ſed tantū ſubſidia peculiaria poſtulant. Non equidem viuendi leges & pharmaciam vniuerſalem, niſi ob ſymptomatum atrocitatem immutant. Sed quia non pauci contendunt poſt apparentia bubonis & carbūculi veſtigia ſanguinem minimè mittendū eſſe, tutioremq; ſudoribus proliciendis locum patere, hāc quæſtionē ſic breuiter dirimendā eſſe cēſeo. Si ſanguis in principio detractus eſt, ante bubonis & carbūculi eruptionē, aut manifeſta ſecuritatis indicia ſe pferunt, aut vires elangueſcunt, aut inſignis a deſt impuritas, non videtur eſſe venæ elidenda, ſed carbunculus & bubo alexipharmacis intus ſumptis & admotis peculiarib. remedijs oppugnabūtur. Si verò cū
magno

magno incēdio sanguis exuperat, febrisq; sæuissimis stipata symptomatib. post appa-
rentē bubonē & carbunculum immaniter
excruciat, viresq; adsint robustæ, omnium
medicorū iudicio sanguis venit detrahēd⁹
q; natura leuata reliquias minori negotio
euincit, cor ad emundatoria venenatā quali-
tatē simul cū sanguine p̄pellit, feraq; sym-
ptomata simul mitescunt. Quod cōfirma-
uit Gal. lib. 10. Meth. c. 10. cū prodiit ad
carbunculi curationē, sanguinē ad lipothi-
miā mittendū esse, vt putredo & incendiū
imminuantur. In hoc negotio non videtur
esse, cōtra quorumdā opinionem verenda
exagitatio. Quippē si maligna substantia
circa cor inhærescit, nulla per sanguinis
missionem consequetur exagitatio, & si à
corde, aliarumq; partium robore in partes
externas cōmode extrudatur, sine vllō ex-
agitationis detrimento belle & prospere
hoc succedet. Quod præstandū est cū vi-
res sunt vegetæ, plethora adest, incendiū
vrget, symptomataq; anxie sollicitant. Vbi
verò elanguescunt vires, insignisq; obrepit
impuritas, pauciq; spiritus supersunt, san-
guis nō videtur esse exhauriendus, ne ob to-
tam spirituum purorum iacturā inopinata
mors immineat. Quò enim maior delitescit impuritas accedente viriū infirmitate,

*Curatio bubo-
nis & carbun-
culi.*

tantò minor sanguinis euacuatio tētanda
est, quā spiritus pauci simul exhalāt. Quo-
circa in magno incendio, in exuperāte san-
guinis copia, in inflātionib. partiū prin-
cipum, vena est potius resignanda in prin-
cipio, quā artis ope sudores proliciendi.
Nam in principijs morborū, in virib. copia
oppressis, in maligna qualitate, in partiū
principum inflātionib. præsentiissimū
censetur esse remediū sanguinis missio. Va-
cuatio verò, quæ fit beneficio sudorum in
principijs morborū, in obstructionib. in in-
flammationib. in copia obruente, in mali-
gna qualitate partē principē obsidēte, an-
te obstructionē expeditā, et exhaustā hu-
morū peccantiū colluiē est suspecta, maxi-
mè cū pori sunt obstructi, naturæq; motus
eò nō inclināt. Sudores equidē mouentiū
vices supplere feliciter possunt bezoardica
seu amuleta intus sumpta cōmemorata, &
accōmodata præsidia buboni et carbuncu-
lo admouenda, quæ postea sequuntur. Nā
sola remedia sudores cientia humores ex-
agitarent, & per vniuersum corporis habi-
tum sparsim dispergerent, certoq; naturæ
conarui obsisterēt, nisi eiusdē motus foras
huc atq; illuc vergeret, vt apparet in exan-
thematis. eēthimatis, & febre pestilenti
diaria. In curando verò bubone attrahētia
&

& mollientia ab Arabibus probata, cœpe cum theriaca coctū et admotū, cucurbitulæ, hirudines, maturantia & causticum seu abscissio cōmendantur. Post apertionē bubōis vlcus detergebatur, et cicatrix inducitur, nō alia methodo, quā quę in alijs vlceribus obseruatur. In obliterando verò carbunculo celebrantur refrigerantia, et discutientia, attrahentia: veluti cucurbitulę, hirudines, anus galli admotus, incisiones altius penetrātes, causticū crustā inducens, crustam adimentia ex butyro recenti, & vitello oui cōparata: deinde detergentia aliorum vlcerū more sensim instituenda. Sola reprimentia buboni et carbunculo imposita, sunt prorsus abdicanda, ne virus intrō cōpellant. In ardore aut carbunculi leniendo circa partes vicinas refrigerantia, sicuti oxycratum, et vnguentum nutritum tutius admouentur.

Symptomata demulcentibus, vt delirium, carum, syncopem, deiectam appetentiam, vomitum, alui profluium, & extremarum partium frigiditatem. Deliriū profligatur clisteribus, oxyrhodino fronti & futuræ coronali admoto, aut pane cum seminibus papaueris albi, lactucę et rosarum permisto, & in principio adhibito; vena frontis secta, frictionibus singularum par-

VIII.

tium, & hyrudinibus naribus affixis. Carius clysteribus acrioribus, scapulis admotis, ligaturis dolorem infligentibus, sinapismis & vesicatoris superiori parti colli impositis abigitur. Syncope verò adimitur, vbi contrahitur aëre corrupto, si mutetur cœlum, aut suffitibus emendetur aër. Cùm autem à malignis vaporibus proficitur, alexipharmaca intus sumpta, & epithemata cordi, hepati, & testibus admota rite instituuntur. Appetentia deiecta propulsabitur cibus appetitum prostratum suscitantibus, intemperiem alterantibus, & putredini resistentibus, cuiusmodi sunt gelatinæ, consumpta, instaurantia, succis limonum, cytri & arantiorū simul perfusis. Si humores in ventriculo cumulati congesti id mali protulerunt, clysteres iniectione probantur, aut si nauseam mouerint, vomitu, vt placuit Auic. sunt excernendi. Ceterum si vomitus vrget, cōpescendus venit, præsertim cū vires fatiscūt, maligna q̃; qualitas iā excreta est. Vomitus autem sedantia sumpta, & admota regioni ventriculi iam supra cōmemorata hoc negotium sceleriter præstabunt. Alui profluuiū, quod à vehementi incendio colliquescente causas trahit, refrigerantibus sumptis, & clysteribus astringentibus. & roborantibus. ad motisq̃
epithe-;

epithematib. regioni ventriculi, & hepatis
superponendis sedabitur. Cū extremarum
partiū frigiditas originē ab inflāmatione
ducit, venę sectione, alterantib. sumptis &
admotis tolletur. Si verò calor imbecillus
huius mali causam dederit: cibi euchimi
multū & citò nutrientes, veluti gelatinæ,
consumpta & instaurātia sēpe & parū sunt
exhibēdi. Reliquorū symptomatū curatio
ex præcedentib. permittis semper bezoar-
dicis petenda est. Superest peltis præserua-
tio, quę in legitima & tēpestiua victus rati-
one alexipharmacis, & pharmacia cōsistit.
Primum viuendi leges versabuntur in de-
centi qualitate, quantitate, vtendi modo
& occasione sumendorum, admouendorū
educendorum, & faciendorum, quæ Hip-
pocrates ad aërem, laborem, cibum, potū,
quietem, somnum, vigiliā, & omnia medi-
ocria retulit. Cū aër sit vitæ nostræ author,
& omnium morborum seminarium eligē-
dus venit purus, aut si impurus necessario
obtingit, suffitibus accōmodatis alterabi-
tur. Quī degunt in aëre impuro & corru-
pto, vestib. serico potius quā lana conte-
xtis induantur, si facultates suppetant. Ci-
bi erunt pauci potius quā varij, euchimi
nec auara, nec liberaliori manu sumpti,
benè dentibus contriti, hora consuetā, &

diu post exercitium ingesti. Vitandus erig-
cibus, qui molestā ventriculo grauitatē, &
potius qui nausēā adfert. Vino vtendū erit
oligophoro, qđ à Rhase in regione æstuo-
sa, & cœlo calidiore dānatur, & prorsus in-
terdicitur. Interim inædia et intēperantia
in constitutione pestilenti obnixē fugien-
da erunt. Motus debet esse mediocris, qui
calorem innatum excitat, excrementa de-
pellit, & cōcoctionē iuuat, nullus crudi-
tem, immoderatus imbecillitatē & humo-
rum exagitationē inuehit, in aëre q; impu-
ro pestis contagia prōptius ingenerat. Sō-
nus mediocris cōcoctionē, paucus crudi-
tatem profert. Venus cane peius & angue
vitabitur. Affectus omnes sunt parum tuti,
nisi sola lætitia, quæ calorē innatū recreat
& excitat. Ira enim excandescentiā & hu-
morum exagitationē, tristitia spiritūū con-
sumptionē adfert. Sequūtur alexipharma-
ca suprā cōmemorata, veluti theriaca, mi-
thridatium, confectio ex ovo, è iuglandib.
ficubus, et rutha, quæ necessitate vrgente
sumenda erunt. Restat pharmacia, quæ ca-
cochimis tantū congruit, qui catapotia pe-
stilētia per interualla deuorare poterūt.
Qui plethora laborant, aut extenuante vi-
tus ratione, aut sanguinis missione indi-
gent. Arabes causticū alicui parti impositū

com-

commendant. Satis de febre pestilenti dictum est, nunc de sudore británico differendum venit, cuius integra curatio tria remedium capitā cōplectitur, vtpote legitimā victus rationē, accommodatū bezoardicorum vsum, opportunā & tempestiuā sudorum extractionē. Victus tenuis primo loco instituetur, ne liberalior frugiferā sudorū eruptionē intercipiat. Si aut vires vegetæ ferre possent, ab omni cibo interdicens essent ægri, ne eiusdem occurſu naturæ motus interrumpatur. Tamen quia hoc effrenato affectu correpti, stomachi, & capitis dolore feruido cruciantur, sitiq; molesta importunitate anxie diuexantur: huic demulcendæ ptisana & syrupis è limonibus, è granatis, violaceo, alijsq; eiusmodi succurrendum erit. Cū verò pernicioſa humorum illuies cor labefactet, & obterat, alexipharmaca in febre pestilenti tradita cōmodè exhibebuntur. Cæterū sedula debet esse cautio in eliciendis sudorib. qui quidem si subsistūt, repente è medio tollitur: si vberius effundantur, foetido sudore exoluitur eger. Quocirca in dignoscendis viribus pulsus tāquā certissimus testis est exacte perpendendus, qui si languidus apparet, exuperans sudoris profluuiū artis præsidij compescendum venit. Aër enim res

*Sudoris Britā-
nici curatio.*

frigerans industria apparandus, molliq̃ue
velte contegendus erit æger, cuius sinistre
māmæ epithema, & cataplasma ex rosis,
sumach, rhoe: & palmulis comparatū ven-
tri inferiori ad sistendam sudorum eruptio-
nem ritē admovebuntur. Vbi verò sudor
supprimitur, copiosioribus stragulis uten-
dum erit, calidior aër inducetur, somnus
cōciliabitur, syrūpi sudorē cientes exhibe-
buntur, & clysteres iniicientur. Non dissi-
mili modo accidit in hac febre, vt in synco-
pali ab Arabibus minuta dicta, in qua pro-
pter humorum tenuitatem & resolutionē
periclitantur ægri. Ab hac etiam non mul-
tum differt febris cardiaca, cuius Celsus &
Græci recentiores meminerunt. Quamob-
rem in hoc perpetuo incumbēdum est, vt
ad motam manu carpo pulsus exploretur, vi-
riumq̃ue robur certo perpendatur, & me-
diocre adsit sudorum profluuium. Vt hoc
assequi liceat hoc morbo correpti in lecto
continebuntur, pedes & manus quantum
feri potest ob sudorum suppressionē neu-
tquam iactabunt à noxijs animi affectibus
arcebuntur, in spem prosperæ valetudinis
erigentur, gelatinis instaurantibus, & hor-
deatis fulcientur, si in ædiam propter viri-
um infirmitatem ferre nō possunt, ptisana
ad sedandā sitim, utentur. Celsus in cardia-
co affe-

co affectu, nisi necesse est non esse festinan-
dum ad vinum, censet. Odores, qui à Gre-
cis & Arabibus ad re sarciendam spirituum
iacturam commendantur: huic affectui su-
pra modum conferre poterunt, cuiusmodi
sunt aqua rosarum, acetum, vinum & san-
tala. Interim etiam alexipharmaca oportu-
ne instituantur: nisi equidē hęc dextre ad-
ministrantur, ægri aut sunt deperditæ san-
tatis, aut in eundem affectum sæpe relabū-
tur, vt cronica Anglorum apertē declarāt.

Quare methodicam febrium curationē
sigilatim perstrinxi: nunc eodē ordine ex-
plicandum est, quibus viuendi legibus,
qualibus, & quantis præsidijs, paucis, vel
pluribus, vna vel recidina vice repetitis,
quomodo, per quē locum, & quādo mor-
bi singularum partium sunt profligandi.



ERRATA

Pag. 13. lin. 23. pyrotechnia. pag. 46. 16. liber. alius cenat. &
post interit vitabitur. pag. 77. 3. sphacelismo. pag. 82. 13.
tenuans. pag. 87. 27. formabuntur pag. 98. 10. febresq;
pag. 107. 24. chamædri. pag. 108. 1. hiera diacolocyntidos.

Methodus Substantia	pag	1
Enz diaz & febri		16
Synochi na pñ	Vas	22
	Vas	27
Contine	hectica	32
	Contine	44
	ex conditate	60
	symptomati	69
Enzolidiana		84
	Tertia	94
Inter mit lentes	Enzotoma	101
	Impliciter ejusdem gr̃is	113
	Diversi gr̃is	118
Pestilenti		125
Ludovici Britannici		153



